

**TEUCRIUM AUREUM SUBSP. TURDETANUM
DEVESA & VALDÉS-BERMEJO, SUBSP. NOV.**

por

JUAN ANTONIO DEVESA* & ENRIQUE VALDÉS-BERMEJO**

Resumen

DEVESA, J. A. & E. VALDÉS-BERMEJO (1984). *Teucrium aureum* subsp. *turdetanum* Devesa & Valdés-Bermejo, subsp. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1):87-90.

Se describe para el SW de España un nuevo taxon del género *Teucrium*, *T. aureum* subsp. *turdetanum* Devesa & Valdés-Bermejo.

Abstract

DEVESA, J. A. & E. VALDÉS-BERMEJO (1984). *Teucrium aureum* subsp. *turdetanum* Devesa & Valdés-Bermejo, subsp. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1):87-90 (In Spanish).

In this paper a new taxon of the genus *Teucrium* from SW Spain is described, *T. aureum* subsp. *turdetanum* Devesa & Valdés-Bermejo.

SCHREBER (1773) describió dentro de la sect. *Polium* un nuevo taxon, *T. aureum*, indicando su distribución en «Hispania, Gallia australi, Syria» y subrayando entre otros de sus caracteres su indumento de intensa coloración amarillenta («summitatibus luteis nitidis»). PUECH (1976) y VALDÉS-BERMEJO & SÁNCHEZ CRESPO (1978) reconocen la existencia de este taxon en el NE de España y SE de Francia y subordinan a él con categoría subespecífica dos táxones previamente descritos por WILLKOMM (1868), *T. aureum* var. *latifolium* y *T. aureum* var. *angustifolium*. Estos dos últimos táxones se encuentran netamente separados geográficamente entre sí y respecto al primero ya que, *T. aureum* subsp. *latifolium* (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez Crespo se localiza en la región levantina en tanto que *T. aureum* subsp. *angustifolium* (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez Crespo aparece en las sierras subbéticas y prebéticas del S de España. Los tres táxones se diferencian perfectamente entre sí (vide PUECH, *l.c.*; VALDÉS-BERMEJO & SÁNCHEZ CRESPO, *l.c.*) y parecen constituir un grupo perfectamente delimitado dentro de la subsect. *Polium*.

En las sierras subbéticas del S de la provincia de Córdoba se localizan unas poblaciones cuyos individuos recuerdan por sus caracteres morfológicos a *T. aureum* Schreber y a *T. lusitanicum* subsp. *aureiformis* (Rouy) Valdés-

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Apartado 1095. Sevilla.

(**) Rúa de Castelao, 6. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.

Bermejo. Observando el indumento, cuya importancia es grande en el género (MANZANARES & *al.* 1983), se comprueba cómo estos especímenes presentan como carácter fundamental un intenso indumento áureo a nivel de la inflorescencia (los tallos son grisáceo-tomentosos), integrado a nivel del cáliz por pelos muy ramificados que, no obstante, no llegan a alcanzar el aspecto coraliforme típico de *T. aureum* subsp. *latifolium* y *T. aureum* subsp. *angustifolium*, acercándose más al tipo de tricoma que presenta *T. lusitanicum* subsp. *aureoformis*. Sin embargo, al igual que aquéllas (y la subsp. *aureum*), estos ejemplares presentan dientes calicinales estrechamente triangulares o triangular-acuminados así como lóbulos posteriores de la corola ciliados en ápice y márgenes, y no dientes provistos de mucrón subterminal y lóbulos posteriores de la corola glabros como los presenta *T. lusitanicum* subsp. *aureoformis*. Estos individuos constituyen sin lugar a dudas un nuevo taxon, que se considera en el presente trabajo subordinado a *T. aureum*, quedando éste representado en la Península Ibérica por cuatro subespecies que pueden separarse en base a la clave siguiente:

1. Indumento de los dientes calicinales de pelos largos y ramificados, a veces poco ramificados o incluso simples 2
1. Indumento de los dientes calicinales de pelos cortos y muy ramificados, coraliformes. 3
2. Núculas distalmente pelosas a. subsp. **aureum**
2. Núculas glabras d. subsp. **turdetanum**
3. Corola 4-5 mm b. subsp. **angustifolium**
3. Corola 5,5-8,5 mm. c. subsp. **latifolium**

Teucrium aureum Schreber, Pl. Vert. Unilab.: 43 (1773).

a.—subsp. **aureum**

b.—subsp. **angustifolium** (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez Crespo, Acta Bot. Malacitana 4:43 (1978).

T. aureum var. *angustifolium* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:478 (1868).

T. aureum subsp. *angustifolium* (Willk.) Puech, Rech. Biosyst. Teucrium 1:73 (1976), non rite publ.

c.—subsp. **latifolium** (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez Crespo, Acta Bot. Malacitana 4:42 (1978).


T. aureum var. *latifolium* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:478 (1868).

T. aureum subsp. *latifolium* (Willk.) Puech, Rech. Biosyst. Teucrium 1:72 (1976), non rite publ.

T. carthaginense var. *homotrichum* Font Quer, Fl. Hisp. Quinta Cent.: 7-8 (1948).

d.—subsp. **turdetanum** Devesa & Valdés-Bermejo, **subsp. nov.**

Perenne, dense cinereo-tomentosum aurea inflorescentia excepta. Calix 5-6,5 mm, dentibus triangularibus aut triangulari-acuminatis atque pilis longis ramosisque obsitis. Corolla 6-8 mm, lobulis lateralibus margine dense ciliatis. Nuculae glabrae.



Planta perenne de tallos grisáceos e inflorescencia intensamente áurea. Cáliz 5-6,5 mm, con dientes triangulares o triangular-acuminados provistos de pelos largos y muy ramificados. Corola 6-8 mm, con lóbulos posteriores densamente ciliados en márgenes y ápice. Núculas glabras.

Holotypus: Córdoba. Sierra Horconera [Halconera], 29-VI-1963, *E. F. Galiano*, SEV 4581.

Ecología y distribución: Calcícola. Roquedos, pedregales y garrigas de la Sierra de Horconera y Sierra de Alhucemas (Córdoba).

Material estudiado: CÓRDOBA. Priego de Córdoba, Sierra de Horconera (UG-83), 27-VI-1980, *J. M. Muñoz*, SEV 90879, COFC 8685/80; ibídem, 4-VII-1980, *J. M. Muñoz & R. Tormo*, SEV 90878, COFC 9304/80; Sierra Horconera [Halconera], 29-VI-1963, *E. F. Galiano*, SEV 4581, holótipo; Sierra de Alhucemas, 14-VII-1975, *J. L. Uberta*, SEV 52395.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento al Prof. Dr. J. M. Díaz de Bustamante por su desinteresada transcripción al latín de la descripción así como al Dr. J. M. Muñoz quien amablemente nos cedió para su estudio parte del escaso material existente de este taxon.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MANZANARES, P., C. GÓMEZ-CAMPO & M. E. TORTOSA (1983). Estudios sobre el indumento de las especies ibéricas y baleáricas del género *Teucrium* L. (Lamiaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1):93-106.
- PUECH, S. (1976). *Recherches de biosystème sur les Teucrium (Labiées) de la Section Polium du bassin méditerranéen (Espagne et France)*. Thèse. Montpellier.
- SCHREBER, J. C. D. (1773). *Plantarum verticillatarum unilabiarum*. Leipzig.
- VALDÉS-BERMEJO, E. & A. SÁNCHEZ CRESPO (1978). Datos cariológicos y taxonómicos sobre el género *Teucrium* L. (Labiatae) en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malacitana* 4:27-54.
- WILLKOMM, M. (1868). *Teucrium*. In: M. Willkomm & J. Lange (Eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* 2:467-490. Stuttgart.

Aceptado para publicación: 7-II-84