POLVO DE CATECÚ.

Pulvis catechu.

Prepárese como el de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
DÓSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo (½ á 1 *escrúpulo).*

POLVO DE COLOQUÍNTIDA.

Pulvis colocynthidis.

Extráiganse las semillas de las coloquíntidas; deséquese la parte carnosa en estufa; pulverícese por contusion en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamiz fino, sin dejar resíduo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*
DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos).*

POLVO DE CORNEZUELO DE CENTENO.

Pulvis secalis cornuti.

Prepárese como el de cubeba.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante de la inervacion motriz, y con especialidad de la del útero.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

POLVO DE CUBEBA.

Pulvis cubebæ.

Deséquese el fruto en estufa; pulverícese por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz entrefino, dejando de resíduo la décimasexta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante. De uso especial en las blenorreas.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma).*

POLVO DE CUERNO DE CIERVO CALCINADO.

Pulvis cornu cervi usti.

Ráspese con un cuchillo el cuerno de ciervo calcinado, para separar todas las partes vitrificadas, incompletamente calcinadas ó ennegrecidas por carbon; pulverícese por contusion en mortero de hierro, y pásese por tamiz fino; porfirícese este polvo con intermedio de agua; extráigase por dilucion el más fino, y continúese la porfirizacion y dilucion sobre el más grueso, hasta que quede todo reducido á polvo impalpable.

Háganse trociscos, y deséquense.

Sirve para varios preparados.

POLVO DE DIGITAL.

Pulvis digitalis.

Deséquense las hojas de digital en estufa; pulverícense por

contusion en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de resíduo la cuarta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Regularizadora de la inervacion cardiaca, y diurética.*

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 *á* 2 *granos).*

POLVO DE DRAGONTEA COMPUESTO.

Pulvis dracontii compositus.

POLVO BENEDICTO DE LOECHES.—Pulvis benedictus ex Loeches.

Polvo de raíz de dragontea.	90 gramos.
Arsénico blanco.	30 —
Hollin.	12 —

Porfirícese el ácido arsenioso con alcohol de 60°; séquese bien, y mézclese exactamente con la dragontea y el hollin.

Consérvese en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica. De uso especial en las úlceras carcinomatosas.*

POLVO DE ESCAMONEA.

Pulvis scammonii.

Prepárese como el de asafétida, precaviéndose del polvo que se levanta durante la operacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*

DÓSIS—De 1 á 4 decigramos (2 *á* 8 *granos).*

POLVO DE ESCILA.

Pulvis scillæ.

Tómense las escamas intermedias de los bulbos de escila; córtense á lo largo ó al través en tiras estrechas; deséquense; pulverícense en mortero de piedra, y pásese el polvo por tamiz fino, sin dejar resíduo.

Debe conservarse en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*

DÓSIS.—De 5 á 15 centigramos (1 *á* 3 *granos).*

POLVO DE FELANDRIO.

Pulvis phellandrii.

Séquese bien el fruto en estufa ó al sol; pulverícese por contusion en mortero de hierro, y pásese el polvo por un tamiz entrefino, dejando de resíduo la sexta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante. De uso especial en las afecciones crónicas del aparato respiratorio.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

POLVO DE GOMO-RESINA AMONIACO.

Pulvis gummi-resinæ ammoniaci.

Prepárese como el de asafétida.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos*).

POLVO DE HELECHO MACHO.

Pulvis filicis maris.

Prepárese como el de ruibarbo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vermífuga.*
DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 *á* 4 *dracmas*).

POLVO DE IPECACUANA.

Pulvis ipecacuanhæ.

Deséquese la raíz de ipecacuana en estufa; pulverícese por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz fino, dejando de resíduo la cuarta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emética y expectorante, segun la dósis.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos*), *como emético;* y de 5 á 15 centigramos (1 *á* 3 *granos*), *como expectorante.*

POLVO DE IPECACUANA OPIADO.

Pulvis ipecacuanhæ opiatus.

POLVO DE DOWER.—Pulvis ex Dower.

Polvo de sulfato potásico.	30	
— de nitrato potásico.	45	
— de ipecacuana. . .	De cada cosa.	8
— de ópio.		

Mézclese exactamente el ópio con la ipecacuana, por trituracion, en mortero de piedra ó de porcelana; añádanse las sales bien secas, y continúese triturando hasta que resulte una mezcla homogénea.

Cada gramo contiene cerca de 88 miligramos de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina y diaforética.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

POLVO DE JABORANDI.

Pulvis pilocarpi.

Prepárese con las hojas de jaborandi, como el polvo de digital.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética y sialagoga. Se emplea en las afecciones catarrales y reumáticas.*

DÓSIS.—De $^1/_2$ á 1 gramo (10 *á* 20 *granos).*

POLVO DE JALAPA.

Pulvis jalapæ.

Prepárese como el de ruibarbo, precaviéndose del polvo que se levanta durante la operacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo ($^1/_2$ *á* 1 *escrúpulo).*

POLVO DE JALAPA COMPUESTO.

Pulvis jalapæ compositus.

Polvo de jalapa.	De cada cosa...	30 gramos.
— de crémor tártaro. .		
— de óxido magnésico..		

Mézclense exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma).*

POLVO DE MAGNESIA CON RUIBARBO.

Pulvis magnesiæ cum rheo.

Hidrocarbonato magnésico. . . .	60	gramos.
Ruibarbo en polvo..	15	—
Azúcar blanco en polvo..	40	—
Esencia de hinojo..	1	—

Interpóngase la esencia en el azúcar, y añádase el hidrocarbonato y el ruibarbo, préviamente mezclados.

Guárdese en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente, tónica y purgante. Se emplea en ciertas dispepsias.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), como absorbente, tónica y en las dispepsias;* y de 10 á 20 gramos (3 *á* 6 *dracmas), como purgante.*

POLVO DE NUEZ VÓMICA.

Pulvis nucis vomicæ.

Expónganse las semillas de nuez vómica sobre un tamiz á la accion del vapor de agua, hasta que se reblandezcan; quítese la cubierta exterior de las semillas; divídanse en pedazos pequeños por medio del cuchillo de palanca; pulverícense por contusion en mortero de hierro; pásese el polvo por tamiz entrefino, y deséquese en la estufa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante de la inervacion motriz.*

DÓSIS.—De 2 á 4 centigramos (*$^2/_5$ á $^1/_5$ de grano).*

POLVO DE OJOS DE CANGREJO.

Pulvis oculorum cancri.

Lávense los ojos de cangrejos con agua caliente; séquense bien; pulverícense por contusion en mortero de hierro; pásese el polvo por tamiz fino; lávese este polvo cuatro ó cinco veces con agua hirviendo; porfirícese húmedo; sepárese por medio de la dilucion el polvo muy fino; continúese la porfirizacion y dilucion sobre las partes más gruesas, hasta que todo quede reducido á polvo impalpable; redúzcase á trocisços, y deséquese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente. Usado contra las acedías.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos (*$^1/_2$ escrúpulo á media dracma).*

POLVO DE PAULINIA.

Pulvis paullniæ.

POLVO DE GUARANA.—Pulvis guaranæ.

Redúzcase á fragmentos pequeños la guarana, y pulverícese en un mortero de hierro bien seco; deséquese en la estufa el producto; pásese por un tamiz de seda, y vuélvase á pulverizar el resíduo, repitiendo con él estas operaciones, hasta que todo quede reducido á polvo fino.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente, y recomendada especialmente en el tratamiento de la hemicranea y otras neuralgias de la cabeza.*

DÓSIS.—De $^1/_2$ á 1 gramo (10 *á* 20 *granos).*

POLVO DE QUINA CALISAYA.

Pulvis quinæ calisayæ.

Ráspense con un cuchillo las cortezas, si tuvieren peridermo, para separarle; deséquense en la estufa; pulverícense por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz muy fino, dejando de resíduo la cuarta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica y antiperiódica, segun la dósis y modo de administracion.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos ($^1/_2$ *á* 1 *dracma).*

POLVO DE QUINA DE LOJA.

Pulvis quinæ ex Loja.

Ráspense con un cuchillo las cortezas, para separar el peridermo; séquense en la estufa; pulverícense por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz muy fino, dejando de resíduo la décima parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica y antiperiódica, segun la dósis y modo de administracion.*

DÓSIS.—De 4 á 8 gramos (1 *á* 2 *dracmas).*

POLVO DE RAÍZ DE GRANADO.

Pulvis radicis punicæ.

Tómese la corteza de la raíz de granado silvestre; deséquese en la estufa; pulverícese por contusion en mortero de hierro; y pásese por tamiz fino, dejando de resíduo la decimasexta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tenífuga.*

DÓSIS.—De 2 á 8 gramos ($^1/_2$ *á* 2 *dracmas).*

POLVO DE REGALÍZ.

Pulvis glycyrrhizæ.

Ráspense las raíces con un cuchillo, para separar la epidermis parda que las cubre; córtense en rodajas muy delgadas; dese-

quense en estufa; pulverícense por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz muy fino, dejando de resíduo la octava parte.

Sirve para varios preparados.

POLVO DE RUIBARBO.

Pulvis radicis rhei.

Límpiense estas raíces de todos los cuerpos extraños adheridos; divídanse en pedazos por contusion; deséquense en la estufa; pulverícense, tambien por contusion, en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz fino, dejando de resíduo la décimasexta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y purgante, segun la dósis.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *granos á* $^1/_2$ *escrúpulo), como tónica;* y de 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma), como purgante.*

POLVO DE SANTÓNICO.

Pulvis santonici.

Tómese el santónico; deséquese en la estufa á un calor suave; pulverícese por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de resíduo la duodécima parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vermífuga.*

DÓSIS.—De 1 á 2 gramos (1 *á* 2 *escrúpulos).*

POLVO DE SANTÓNICO COMPUESTO.

Pulvis santonici compositus.

POLVO VERMÍFUGO.—Pulvis vermifugus.

Polvo de santónico. . . .	De cada cosa. .	15 gramos.
— de coralina.. . . .		
— de ruibarbo.	8	—

Mézclense exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vermífuga.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma).*

POLVO DE TANACETO.

Pulvis tanaceti.

Deséquense las sumidades floridas del tanaceto; pulverícense por contusion en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de resíduo la cuarta parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vermífuga.*
DÓSIS.—De 1 á 2 gramos (1 *á* 2 *escrúpulos).*

POLVO DE VALERIANA.

Pulvis valerianæ.

Quebrántense ligeramente las raíces de valeriana en mortero de hierro y mano de madera; sepárese por medio de un tamiz

de crin la tierra adherida; séquense en la estufa; pulverícense por contusion en mortero de hierro y mano de lo mismo; y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de resíduo la duodécima parte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica y tónica.*
DÓSIS.—De 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma).*

POLVO DENTÍFRICO.

Pulvis dentifricus.

Polvo de crémor tártaro.	De cada cosa. .	15	gramos.
— de sangre de drago.			
— de cuerno de ciervo calcinado			
— de lirio de Florencia..		8	—
— de clavo de especia..		4	—
— de cochinilla.		0,6	—

Mézclense exactamente.

USO.—*El que designa el nombre de la fórmula.*

POLVO DENTÍFRICO CARBONOSO.

Pulvis dentifricus carbonosus.

Carbon de tilo ó de chopo.	De cada cosa..	200	gramos.
Polvo de quina de Loja.			
Esencia de menta piperita.		1	—

Redúzcase el carbon á polvo muy fino, mézclese con el polvo de quina, y añádase la esencia.

USO.—*El que designa el nombre de la fórmula.*

POLVO EMOLIENTE.

Pulvis emolliens.

Polvo de raíz de altea. . .	De cada cosa partes iguales.
— de hoja de malva. .	

Mézclense.

Sirve para la confeccion de cataplasmas.

POLVO GASÍFERO FERRUGINOSO.

Pulvis aërophorus ferrugineus.

Polvo de bicarbonato sódico. . . .	25 gramos.
Tartrato férrico potásico en polvo. .	2 —

Mézclese y divídase en doce papeles azules.

Polvo de ácido tartárico.	15 —

Divídase en doce papeles blancos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante de la inervacion gástrica, y reconstituyente.*

DÓSIS.—*Un papel de cada color.*

Para usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta el tercio de su capacidad; disuélvase en ella el ácido contenido en un papel blanco; añádase la mezcla de un papel azul; agítese, y bébase prontamente el líquido espumoso.

POLVO GASÍFERO LAXANTE.

Pulvis aërophorus laxativus.

POLVO DE SEDLITZ.—Pulvis ex Sedlitz.

Polvo de tartrato potásico sódico. . . . . 90 gramos.
— de bicarbonato sódico. . . . . 30 —

Mézclese, y divídase en doce papeles azules.

Polvo de ácido tartárico. . . . . 30 —

Divídase en doce papeles blancos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante de la inervacion gástrica, y laxante.*

DÓSIS.—*Un papel de cada color.*

Para usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta la mitad de su capacidad; disuélvase el ácido contenido en un papel blanco; añádase la mezcla salina de un papel azul; agítese prontamente, y bébase durante la efervescencia del líquido.

POLVO GASÍFERO SIMPLE.

Pulvis aërophorus simplex.

POLVO DE SELTZ.—Pulvis ex Seltz.

Polvo de ácido tartárico. . . . . 15 gramos.

Divídase en doce papeles blancos.

Polvo de bicarbonato sódico. . . . 25 —

Divídase en doce papeles azules.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante de la inervacion gástrica.*

DÓSIS.—*Un papel de cada color.*

Para usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta el tercio de su capacidad; disuélvase en ella el ácido contenido en un papel blanco; añádase despues la sal de un papel azul; agítese, y bébase prontamente el líquido espumoso.

POLVO RESTRICTIVO.

Pulvis restrictivus.

Polvo de bol arménico.	8 gramos.	
— de rizoma de bistorta.	De cada cosa..	30 —
— de rosas rubras. . .		
— de fruto de arrayan. .		
— de fruto de ciprés. .		
— de sulfato zíncico.. .		
— de incienso.		

Mézclense exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
De uso tópico.

POLVO TERIACAL.

Pulvis theriacalis.

POLVO PARA LA TRIACA MAGNA.—Pulvis ad theriacam magnam.

Corteza de la raíz de dictamo blanco.	110 gramos.
Víboras privadas de sus cabezas y piel, desecadas. .	80 —

Opio.	De cada cosa. .	86	gramos.
Pimienta larga.			
Escila desecada..		50	—
Canela de China.		35	—
Semilla de nabo..		70	—
Agarico blanco..	De cada cosa..	45	—
Extracto de regaliz.			
Rosas rubras mondadas.			
Rizoma de lirio de Florencia. . .			
Escordio..			
Azafran.	De cada cosa..	30	—
Mirra.			
Cardamomo menor..		35	—
Vetiver.	De cada cosa..	22	—
Hojas de laurel.			
Dictamo crético.			
Sumidad florida de cantueso.. . .			
Incienso.			
Marrubio..			
Pimienta blanca.			
— negra.			
Raíz de énula.			
Gengibre			
Rizoma de potentila..			
Ruibarbo..			
Sumidad florida de calaminta. . .			
Ácoro.		18	—
Fruto de peregil.		36	—
Fruto de hinojo..		35	—
Raíz de valeriana.		54	—

Benjuí.	De cada cosa. .	15 gramos.
Goma arábiga.		
Fruto de enebro		
Sumidad de polio montano. . . .		
Raíz de genciana.		
— de ápio..		
Gálbano		
Fruto de anís.		
Sumidad de camedrios.		
— de camepiteos..		
— de hipericon.		
Sulfato ferroso, desecado hasta la blancura.		
Bol arménico.		
Extracto de algarrobas..		
Hipocístido.		
Asfalto.	De cada cosa. .	8 —
Castoreos.		
Asafétida..		
Opoponaco.		
Raíz de serpentaria.		
Sumidad de centaura menor. . . .		
Almáciga..	De cada cosa. .	4 —
Tragacanto.		
Leño áloe.		
Maro cortuso.		
Rizoma de ásaro.		
Sumidad de corto hortense. . . .		
— de mejorana.		
Yemas de pino..		

Divídanse convenientemente todas estas sustancias; séquense en la estufa, y redúzcanse á polvo no muy fino, sin dejar resíduo.

Este polvo sirve para preparar la triaca magna, y entra en otros compuestos.

POMADA DE ACONITINA.

Pomatum aconitinæ.

Aconitina.	0,5 gramos.
Aceite de olivas..	1 —
Grasa de cerdo.	20 —

Tritúrese la aconitina con el aceite, y mézclese con la grasa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante, y resolutiva en los infartos dolorosos.*

Se usa en friccion, de 6 decigramos á 1 gramo (½ *á* 1 *escrúpulo).*

POMADA ALCANFORADA.

Pomatum camphoratum.

Alcanfor en polvo..	10 gramos.
Cera blanca.	3 —
Grasa de cerdo..	30 —

Caliéntense suavemente en baño de maría la cera y la grasa, hasta que se lícuen; añádase el alcanfor, y agítese durante el enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica y resolutiva.*

POMADA AMONIACAL.

Pomatum ammoniacale.

POMADA DE GONDRET.—Pomatum ex Gondret.

Amoniaco líquido de 22°.	20 gramos.
Grasa de cerdo.	10 —
Sebo de carnero..	10 —

Lícuense al calor del baño de maría, en un frasco de boca ancha y tapon esmerilado, el sebo y la manteca; retírese el frasco del fuego; déjese enfriar en parte, sin que llegue á solidificarse la materia; añádase el amoniaco; tápese el frasco; y agítese hasta completo enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vesicante rápida.*

POMADA ANTIPSÓRICA.

Pomatum antipsoricum.

POMADA DE HELMERICH.—Pomatum ex Helmerich.

Azufre sublimado.	10 gramos.
Carbonato de potasa pulverizado. .	5 —
Agua destilada.	5 —
Aceite de almendras dulces. . . .	5 —
Grasa de cerdo.	35 —

Disuélvase el carbonato de potasa en el agua, empleando un mortero de cristal; añádase el azufre, y en seguida el aceite y la

grasa; é interpónganse bien estas sustancias hasta obtener una masa homogénea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Contra la sarna.*

POMADA DE AZAHAR.

Pomatum florum aurantii, seu naphæ.

MANTECA DE AZAHAR.—Butyrum naphæ.

Prepárese con la flor fresca del naranjo, como la pomada de rosas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

POMADA DE AZUFRE.

Pomatum sulphuris.

Azufre sublimado.	10 gramos.
Grasa de cerdo.	40 —

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Contra la sarna.*

POMADA DE BELLADONA.

Pomatum belladonnæ.

Extracto de belladona.	6 gramos.
Grasa de cerdo.	30 —

Reblandézcase el extracto por trituracion en un mortero con un poco de agua, y mézclese con la grasa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina.*

POMADA DE BREA.

Pomatum picis liquidæ.

UNGÜENTO DE BREA.—Unguentum picis liquidæ.

Brea..	8 gramos.
Grasa de cerdo.	30 —

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detersiva y desecante.*
Usada en varias dermatosis.

POMADA DE BISULFATO QUÍNICO.

Pomatum bisulphatis quinici.

POMADA ANTIPERIÓDICA.—Pomatum antiperiodicum.

Bisulfato de quinina.	2 gramos.
Grasa de cerdo, ó vaselina. . .	15 —

Deslíase el bisulfato, en la menor cantidad posible de agua, en un mortero de vidrio, y mézclese con la grasa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiperiódica.*

Se emplea en fricciones, en las partes del cuerpo en que sea más fácil la absorcion.

POMADA DE CAMUESA COMPUESTA.

Pomatum pomi redolentis compositum.

Benjuí.		8 gramos.
Clavo de especia. .	De cada cosa.	4 —
Estoraque líquido. .		
Grasa de cerdo.		2070 —
Camuesas cortadas en pedazos. . .		690 —
Agua de rosas. . .	De cada cosa.	86 —
— de azahar. .		

Redúzcanse las dos primeras sustancias á polvo grueso; mézclense con las demás, y téngase la mezcla al calor del baño de maría hasta la evaporacion de toda la humedad; pásese por un lienzo fino sin expresion, y agítese suavemente hasta que la pomada se enfrie.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

POMADA DE CLOROFORMO.

Pomatum chloroformi.

Cloroformo.	10 gramos.
Cera blanca.	5 —
Grasa de cerdo	80 —

Lícuense la cera y la grasa, en un frasco de boca ancha, al calor del baño de maría; déjese enfriar en parte; añádase el cloroformo; tápese el frasco; y agítese hasta completo enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anestésica.*

POMADA DE CLORURO MERCURIOSO.

Pomatum chloruri mercuriosi.

POMADA ANTIHERPÉTICA.—Pomatum antiherpeticum.

Pomada de rosas..	30 gramos.
Cloruro mercurioso precipitado.	4 —

Mézclense exactamente en un mortero de vidrio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva y antiherpética.*

POMADA DE DESAULT.

Pomatum ex Desault.

Polvo de óxido mercúrico rojo. . .	De cada cosa. .	4 gramos.
— de tucia.		
— de acetato plúmbico. . . .		
— de sulfato alumínico potásico.		
— de cloruro mercúrico.		0,6 —
Pomada de rosas.		30 —

Tritúrense los polvos en mortero de vidrio ó de porcelana, para hacerlos impalpables, y mézclense exactamente con la pomada de rosas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva. Usada en algunas oftalmías.*

POMADA ESTIBIADA.

Pomatum stibiatum.

POMADA DE AUTENRIETH.—Pomatum ex Autenrieth.

Tartrato antimónico potásico en polvo fino. .	4 gramos.
Grasa de cerdo.	12 —

Mézclense exactamente por trituracion prolongada en un mortero, añadiendo unas gotas de agua para disgregar la sal.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante, que produce pústulas.*

POMADA FOSFORADA.

Pomatum phosphoratum.

Fósforo.	1 gramos.
Grasa de cerdo.	50 —

Póngase la grasa en un frasco de boca ancha con tapon esmerilado, y de una capacidad tal, que con ella se llene casi enteramente; hágase licuar al calor del baño de maría; añádase el fósforo; tápese el frasco; continúese calentándole, y agítese de cuando en cuando hasta que el fósforo se haya disuelto; sáquese entónces el frasco del baño, y continúese agitándole hasta que se haya enfriado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Muy excitante.*
Se usa en friccion, de 1 á 2 gramos (*1 á 2 escrúpulos).*

POMADA DE IODURO PLÚMBICO.

Pomatum ioduri plumbici.

Ioduro plúmbico.	4 gramos.
Grasa de cerdo.	30 —

Mézclese en mortero de cristal.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva y detersiva.*
Usada con especialidad en las úlceras escrofulosas.

POMADA DE IODURO POTÁSICO.

Pomatum ioduri potassici.

POMADA IODURADA.—Pomatum ioduratum.

Ioduro potásico. . .	De cada cosa. .	4 gramos.
Agua destilada. . . .		
Grasa de cerdo.		30 —

Disuélvase el ioduro en el agua, y mézclese exactamente con la grasa en un mortero.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

POMADA DE IODURO POTÁSICO CON EXTRACTO DE CICUTA.

Pomatum ioduri potássici cum extracto cicutæ.

Pomada de ioduro potásico.. . . .	30 gramos.
Extracto de cicuta.	4 —

Reblandézcase el extracto por trituración en un mortero, con una pequeña cantidad de agua; añádase la pomada, y agítese hasta que la mezcla resulte homogénea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

POMADA DE IODURO POTÁSICO IODADO.

Pomatum icduri potassici iodatum.

Iodo puro.	4 gramos.
Ioduro potásico.	12 —
Agua destilada.	8 —
Grasa de cerdo.	90 —

Disuélvase el ioduro en el agua; añádase el iodo; agítese la mezcla, é incorpórese la grasa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

POMADA MERCURIAL DOBLE.

Pomatum mercuriale duplex.

UNGÜENTO DE MERCURIO DOBLE.—Unguentum hydrargyri duplex.

Mercurio puro.	De cada cosa. .	345 gramos.
Grasa de cerdo.		

Tritúrese el mercurio con la sexta parte de la grasa en un mortero de piedra, hasta la perfecta extincion del metal; añádase entonces el resto de la grasa, y mézclese exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antisifilítica y alterante.*
Se usa en friccion, de 1 á 2 gramos (1 *á* 2 *escrúpulos).*

POMADA MERCURIAL SIMPLE.

Pomatum mercuriale simplex.

UNGÜENTO DE MERCURIO SIMPLE.—Unguentum hydrargyri simplex.

Pomada mercurial doble.	170 gramos.
Grasa de cerdo..	340 —

Mézclense.

Se usa como la mercurial doble, pero aplicándose casi exclusivamente como insecticida.

POMADA MERCURIAL TERCIADA.

Pomatum mercuriale tertiatum.

UNGÜENTO DE MERCURIO TERCIADO.—Unguentum hydrargyri tertiatum.

Pomada mercurial doble.	60 gramos.
Grasa de cerdo..	30 —

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antisifilítica y alterante.*
Se usa en friccion, de 1 á 2 gramos (1 *á* 2 *escrúpulos).*

POMADA DE NITRATO MERCURIAL.

Pomatum nitratis mercurialis.

UNGÜENTO CETRINO.— Unguentum citrinum.

Aceite de olivas.	De cada cosa.	240 gramos.
Grasa de cerdo..		
Mercurio puro..	30	—
Ácido nítrico de 35°.	45	—

Disuélvase el mercurio en el ácido á un suave calor; échese esta disolucion en la grasa licuada con el aceite y medio fria; agítese bien; y cuando tenga la mezcla la consistencia conveniente, deposítese en moldes de papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante, antisifilítica é insecticida.*
Se usa en friccion, de 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma*).

POMADA DE ÓXIDO MERCÚRICO AMARILLO.

Pomatum oxidi mercurici flavi.

Óxido mercúrico amarillo.	1 gramos.
Vaselina.	15 —

Mézclense exactamente en mortero de cristal.

NOTA.—De la misma manera se prepara esta pomada con manteca.

ACCION TERAPÉUTICA. — *Resolutiva. De uso especial en ciertas oftalmias.*

POMADA DE ÓXIDO MERCÚRICO ROJO.

Pomatum oxidi mercurici rubri.

Óxido mercúrico rojo..	1 gramos.
Pomada de rosas.	15 —

Tritúrese bien el óxido mercúrico en un mortero, y mézclese exactamente con la pomada de rosas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva. De uso especial en ciertas oftalmías.*

POMADA DE ÓXIDO ZÍNCICO.

Pomatum oxidi zincici.

Óxido zíncico.	2 gramos.
Grasa de cerdo..	30 —

Mézclense en un mortero.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente. Se usa en algunas oftalmías.*

POMADA OXIGENADA.

Pomatum oxygenatum.

UNGÜENTO OXIGENADO.—Unguentum oxygenatum.

Grasa de cerdo.	240 gramos.
Ácido nítrico de 35°..	30 —

Lícuese la grasa en una cápsula de porcelana; añádase el ácido nítrico; téngase la mezcla expuesta al calor del agua hirviendo, agitándola contínuamente con una varilla de vidrio, hasta que principie el desprendimiento de vapores nitrosos; retírese entonces del fuego; continúese la agitacion de la mezcla; y cuando se halle próxima á la solidificacion, échese en moldes de papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detergente, y caterética en débil grado. Se usa con especialidad en algunas dermatosis.*

POMADA DE ROSAS.

Pomatum rosarum.

UNGÜENTO DE ROSAS.—Unguentum rosarum.

Pétalos de rosa pálida frescos. Grasa de cerdo.	De cada cosa. .	1000 gramos.

Pónganse los pétalos de rosa en digestion con la grasa á un calor suave, por espacio de tres dias; caliéntese la mezcla hasta que esté próxima á hervir; pásese por un lienzo con fuerte expresion del resíduo, y déjese enfriar en reposo. Sepárese, por último, la pomada del sedimento; lícuese de nuevo, y déjese enfriar, agitándola hasta que adquiera consistencia.

Se usa para las escoriaciones, y como escipiente.

POMADA DE RUDA.

Pomatum rutæ.

UNGÜENTO DE RUDA.—Uuguentum rutæ.

Ruda.		
Ajenjo..	De cada cosa. .	60 gramos.
Menta..		
Grasa de cerdo.	500	—

Contúndanse las partes vegetales; mézclense con la grasa; y expóngase la mezcla á un calor moderado, hasta que se haya evaporado toda la humedad; pásese entónces por un lienzo con fuerte expresion, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un calor suave; apártese del fuego, y agítese durante el enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

POMADA DE SAÚCO.

Pomatum sambuci.

UNGÜENTO DE SAUCO.—Unguentum sambuci.

Cortezas frescas de ramas de saúco.	500	gramos.
Hojas de la misma planta. . . .	100	—
Grasa de cerdo.	1800	—

Contúndanse las partes vegetales; pónganse en maceracion por

ocho dias con la grasa de puerco, y procédase en todo lo demás como en la preparacion de la pomada de ruda.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente, y resolutiva en débil grado.*

POMADA DE TANATO DE PLOMO.

Pomatum tannatis plumbici.

Tanato de plomo.	2 gramos.
Grasa de cerdo.	30 —

Interpóngase el tanato en cantidad suficiente de glicerina, en mortero de cristal, y mézclese con la grasa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente. Usada en las úlceras por decúbito.*

POMADA DE TOMATE.

Pomatum lycopersici.

UNGÜENTO DE TOMATE.—Unguentum lycopersici.

Tomates.	De cada cosa.. 345 gramos.
Grasa de cerdo..	

Redúzcanse los tomates á pulpa; mézclense con la grasa, y expóngase la mezcla á un fuego moderado, hasta que se haya eva-

porado toda la humedad. Pásese entónces por un lienzo, con expresion del resíduo; añádase al producto otra cantidad igual de tomates, reducidos tambien á pulpa; expóngase de nuevo al fuego para evaporar la humedad; pásese otra vez por un lienzo con expresion del resíduo, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un suave calor; y déjese enfriar, agitándola, hasta que adquiera consistencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

POMADA DE TORVISCO.

Pomatum gnidii.

Grasa de cerdo..	420 gramos.
Cera blanca..	45 —
Corteza de torvisco..	115 —

Divídase la corteza en pedazos pequeños; humedézcase con alcohol; contúndase en mortero de hierro, hasta que se reduzca á una masa fibrosa; póngase entonces con la grasa al calor del baño de maría, por doce horas; pásese el líquido por un lienzo con fuerte expresion, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada del sedimento que hubiere formado; lícuese con la cera, y déjese enfriar, agitándola hasta que se solidifique.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante y vesicante.*

POMADA DE YEMAS DE ÁLAMO COMPUESTA.

Pomatum gemmarum populi compositum.

UNGÜENTO POPULEON.—Unguentum populeum.

Yemas de álamo negro recientes.	1000	gramos.
Hojas recientes de beleño.		
— — de violeta.	De cada cosa.. 345	—
— — de siempreviva mayor.		
— — de ombligo de Vénus. .		
Hojas de solano negro.	690	—
Grasa de cerdo..	2760	—

Mézclense las yemas de álamo con la grasa derretida; póngase la mezcla en una vasija de vidrio, para ir añadiendo las hojas vegetales contundidas, á medida que las presente la estacion; expóngase la mezcla á un fuego moderado, agitándola contínua mente hasta que se haya evaporado toda la humedad; pásese en seguida por un lienzo con fuerte expresion, y déjese en reposo. Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un calor suave; apártese del fuego, y agítese durante el enfriamiento.

NOTA. En vez de los 1000 gramos de yemas recientes de álamo, pueden emplearse 400 gramos de las yemas secas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante. De uso especial en los tumores hemorroidales.*

POTASA CÁUSTICA POR LA CAL.

Potassa caustica calcis ope.

POTASA CÁUSTICA.—PIEDRA DE CAUTERIO.—Potassa caustica.—Lapis cauterii.

Carbonato potásico.	2
Cal viva.	1
Agua.	25

Disuélvase el carbonato potásico en el agua, y hágase hervir la solucion en vasija de hierro fundido. Apáguese la cal viva, y hágase lechada con suficiente cantidad de agua. Añádase poco á poco esta lechada á la solucion del carbonato potásico, de modo que no se interrumpa la ebullicion, y cuidando además de reemplazar el agua evaporada, para que no descienda el nivel del líquido.

Adicionada toda la cal, manténgase el líquido en plena ebullicion, agitándole con una espátula de hierro, hasta que una pequeña porcion del mismo, filtrada y echada sobre ácido nítrico, no produzca efervescencia; échese entónces toda la masa sobre una manga de lienzo, para separar el líquido del carbonato de cal; lávese éste sobre el mismo lienzo con agua hirviendo; reúnanse todos los líquidos claros; evapórense con rapidez hasta sequedad en vasija de plata, y caliéntese fuertemente el producto hasta que entre en fusion tranquila. Redúzcase entónces á láminas, vertiéndole sobre una plancha de hierro fundido, bien limpia; ó á cilindros, por medio de la rielera; ó á pequeñas pastillas, sacándole con una cuchara de plata con pico, y vertiéndole gota á gota sobre una plancha de hierro bien limpia. Consérvese en frascos de vidrio secos y perfectamente tapados.

ACCION TERAPÉUTICA —*Cáustica.*

PULPA DE CIRUELAS.

Pulpa prunorum.

Expónganse las ciruelas, sobre un diafragma ó un tamiz de cerda, á la accion del vapor de agua, hasta que se ablanden bien; sepárense los huesos; pístese el resto en mortero de mármol con mano de madera, y pásese la pulpa por tamiz de cerda.

Sirve para preparar la conserva.

PULPA DE TAMARINDOS.

Pulpa tamarindorum.

Pónganse los tamarindos en una vasija de loza blanca con un poco de agua; déjense en digestion á un calor suave, hasta que se ablanden bien; pásense despues por un tamiz de cerda, para separar las semillas y las fibras; y evapórese el producto en baño de maría hasta consistencia de extracto blando.

ACCION TERAPÉUTICA —*Laxante.*
DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 *á* 2 *onzas).*

QUERMES MINERAL.

Kermes minerale.

OXISULFURO DE ANTIMONIO HIDRATADO.—ÓXIDO DE ANTIMONIO SULFURADO ROJO.—Oxisulphurum antimonii hydratum.—Oxydum antimonii sulphuratum rubrum.

Antimonio crudo purificado, en polvo muy fino. .	1
Carbonato sódico cristalizado.	22
Agua comun.	300

Hágase hervir el agua en una vasija de hierro fundido, muy limpia; añádase el carbonato sódico, y en seguida el antimonio crudo; sosténgase la ebullicion por una hora, cuidando de agitar el líquido contínuamente; filtrese hirviendo, sobre una vasija que contenga poco más ó ménos tanta cantidad de agua, tambien hirviendo, como la que se hubiere evaporado; cúbrase la vasija despues de filtrado todo el líquido, y déjese enfriar lo más lentamente posible. Recójase al dia siguiente sobre un filtro el polvo precipitado; lávese con agua muy fria, hasta que los líquidos de locion pasen insípidos; comprímase entre papeles absorbentes; séquese en la oscuridad á una temperatura que no exceda de 25°; pásese por un tamiz fino de seda, y consérvese en frascos de vidrio negro con tapon esmerilado.

Polvo ligero, de color rojo pardo, de aspecto aterciopelado; soluble completamente en sulfhidrato amónico; soluble en ácido clorohídrico concentrado en caliente, resultando la disolucion incolora, aunque algo opalina. Tratado con agua destilada, y filtrada ésta, no debe dar reaccion ácida ni alcalina, ni dejar resíduo por evaporacion; y haciendo la misma operacion con ácido tartárico en solucion diluida, y filtrado el líquido, ha de producirse con el hidrógeno sulfurado un precipitado de color anaranjado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 *á* 2 *granos).*

OTRO MÉTODO:

Para la veterinaria, prepárese el quermes por el método siguiente:

Antimonio crudo en polvo fino.	5
Carbonato sódico anhidro.	3
Agua comun.	500

Mézclese el carbonato con el sulfuro; póngase la mezcla en un crisol de barro provisto de su tapadera, y sométase á una temperatura elevada, hasta que la masa se presente en fusion tranquila; viértase entónces sobre una baldosa de mármol caliente; y luego que se haya solidificado, redúzcase á polvo fino.

Con este polvo y el agua, procédase como en el método anterior.

QUININA.

Quinina.

Disuélvase el sulfato quínico en agua acidulada con ácido sulfúrico; precipítese la solucion por amoniaco; recójase el precipitado sobre un lienzo; lávese con agua; exprímase bien, y deséquese al aire.

Sirve para otros preparados.

QUININA PARDA.

Quinina fusca.

Trátese la quina calisaya por el agua acidulada, el carbonato sódico y el alcohol, como para la preparacion del sulfato de quinina, y destílese el líquido alcohólico sin acidularle.—El extracto desecado y pulverizado es la quinina parda.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y antiperiódica, segun la dósis.*
DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 *á* 8 *granos).*

RESINA DE JALAPA.

Resina jalapæ.

Jalapa.	2
Alcohol de 90°.	8

Redúzcase la jalapa á polvo grueso, y macérese en el alcohol por ocho dias; pásese el líquido, con expresion, por un lienzo, y fíltrese. Destílese en baño de maría hasta extraer todo el alcohol; añádase al resíduo un volúmen de agua igual al suyo; déjese enfriar; recójase la resina precipitada; lávese varias veces con agua caliente; disuélvase en una corta cantidad de alcohol; y distribuida la solucion en platos, evapórese en la estufa hasta sequedad.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*
DÓSIS.—De 1 á 3 decigramos (*2 á 6 granos).*

RESINA DE TAPSIA.

Resina thapsiæ.

Tómese raíz de tapsia; divídase en pedazos, y lávense éstos con agua caliente; deséquense despues, y trátense dos ó tres veces con alcohol de 90° caliente; reúnanse los líquidos alcohólicos; filtrense y destílense en baño de maría, para aprovechar el alcohol; trátese el producto varias veces con agua caliente, para separar las partes solubles; y, por fin, evapórese en baño de maría hasta consistencia blanda.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Revulsiva.*
USOS.—*Sirve para preparar el emplasto del mismo nombre.*

RUIBARBO TOSTADO.

Rhabarbarum tostum.

Póngase ruibarbo en polvo grueso en una vasija de plata ó de hierro, y caliéntese suavemente, sin dejar de agitarle, hasta que adquiera un color pardo; pásese por un tamiz, y guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-astringente.*
DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos (*½ escrúpulo á ½ dracma).*

SALICILATO QUÍNICO.

Salicylas quinicus.

Salicilato de sosa.	7,34	gramos.
Agua destilada.	240	—
Sulfato químico.	20	—

Disuélvase el salicilato en el agua hirviendo; añádase el sulfato de quinina, continuando la ebullicion durante algunos minutos, hasta que deje de formarse precipitado; recójase éste, despues de frio, sobre un filtro; lávese con agua destilada, hasta que las aguas de locion no precipiten con el cloruro de bario, y deséquese al aire.

Accion terapéutica.—*Antiperiódica, y en el tratamiento del reumatismo.*

Dósis.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos).*

SALICILATO SÓDICO.

Salicylas sodicus.

Ácido salicílico.	10
Agua destilada.	100
Bicarbonato de sosa.	C. S.

Disuélvase el ácido salicílico en agua, calentando suavemente la mezcla en una cápsula de porcelana; satúrese la solucion con bicarbonato de sosa (6 partes próximamente); fíltrese, y evapórese en baño de maría hasta sequedad.

Polvo blanco, que toma color en contacto del aire; soluble en diez partes de agua fria. Con las sales férricas da color violado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se emplea especialmente en el tratamiento del reumatismo.*

DÓSIS.—De $^1/_2$ á 1 gramo (10 *á* 20 *granos).*

USO EXTERNO.—*Como antiséptico.*

SANTONINA.

Santonina.

Santónico.	4
Hidrato cálcico.	1
Alcohol de 90°.	20

Pónganse estas sustancias en el baño de maría de un alambique, y caliéntense hasta que haya destilado la vigésima parte del alcohol; vuélvase este alcohol al baño de maría; déjese enfriar todo, y pásese por un lienzo con fuerte expresion. Háganse otros dos tratamientos con el resíduo y nuevas cantidades de alcohol; reúnanse todos los líquidos; fíltrense; destílense en baño de maría hasta extraer todo el alcohol; déjese enfriar el resíduo del baño; cuélese; evapórese hasta la mitad en cápsula de porcelana; añádase, estando aún caliente, un ligero exceso de ácido acético; hágasele hervir, y póngase, por fin, en un sitio fresco para que cristalice. Lávense los cristales con un poco de agua primero, y en seguida con un poco de alcohol; y purifíquense, disolviéndolos en ocho veces su peso de alcohol de 90° hirviendo, añadiendo un poco de carbon animal, filtrando el líquido en caliente, y dejándole enfriar lentamente.

Cuando los cristales se hayan formado, sepárese el agua madre, y evapórese para obtener más producto, que se purifica del mismo modo. Consérvese la santonina en vasos negros bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antihelmíntica.*

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 *á* 2 *granos).*

SEBO.

Sebum.

Prepárese con el sebo en rama, como la grasa de cerdo.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE ÁCIDO CRÓMICO.

Solutum acidi chromici.

Ácido crómico. . . .	Partes iguales.
Agua destilada. . . .	

Disuélvase en mortero de cristal.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica.*

SOLUCION DE ARSENIATO POTÁSICO.

Solutum arseniatis potassici.

LICOR ARSENICAL DE FOWLER.—Liquor arsenicalis ex Fowler.

Arsénico blanco en polvo. . .	De cada cosa. .	4 gramos.
Carbonato potásico. . . .		
Agua destilada.	345	—
Alcohol de melisa compuesto.	12	—

Mézclense el ácido, el carbonato y el agua en un matraz de vidrio; hiérvase esta mezcla hasta completa disolucion; fíltrese, y déjese enfriar; añádase el alcohol de melisa y suficiente cantidad de agua destilada, á fin de que el producto total pese 380 gramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Las de la fórmula anterior.*

DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos), pudiendo llegar progresivamente hasta* 5 á 6 decigramos (10 *á* 12 *granos).*

SOLUCION DE ARSENIATO SÓDICO.

Solutum arseniatis sodici.

SOLUCION ARSENICAL DE PEARSON.—LICOR ARSENICAL DE PEARSON.—Solutum arsenicale ex Pearson.—Liquor arsenicalis ex Pearson.

Arseniato sódico cristalizado. . . .	0,05 gramos.
Agua destilada.	30 —

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante, antiperiódica, y de uso especial en algunas dermatosis.*

DÓSIS.—De 4 á 6 decigramos (8 *á* 12 *granos*).

SOLUCION DE BREA CONCENTRADA.

Solutum picis liquidæ.

LICOR DE BREA.—Liquor picis liquidæ.

Bicarbonato de sosa.	1
Brea de pino.	2
Agua.	100

Mézclese en un mortero la brea con el bicarbonato de sosa; añádase el agua y póngase todo en un frasco, agitando con frecuencia hasta que el líquido tome color de café; fíltrese despues de seis dias, y guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Modificadora de las inflamaciones crónicas de las mucosas con aumento de secrecion, y especialmente de la del aparato respiratorio.*

DÓSIS.—De 10 á 20 gramos (2 $^1/_2$ *á* 5 *dracmas*), *en un vaso de agua.*

SOLUCION DE CAL.

Solutum calcis.

AGUA DE CAL.—Aqua calcis.

Cal viva.	30 gramos.
Agua comun.	C. S. —

Apáguese la cal con agua suficiente; agítese con más agua; déjese en reposo; decántese el líquido claro, y deséchese por inútil. Añádanse al hidrato de cal, así lavado, 1000 gramos de agua destilada; y téngase la mezcla en vasija bien tapada, sacando por decantacion el agua de cal, cuando se necesite.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiácida.*

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 *á* 2 *onzas).*

Se usa tambien en locion en el tratamiento de algunas dermatosis

SOLUCION DE CARBONATO AMÓNICO AMONIACAL.

Solutum carbonatis ammonico-ammoniacalis.

ESPÍRITU VOLÁTIL DE CUERNO DE CIERVO.—Spiritus volatilis cornu cervi.

Tómese el líquido acuoso resultante de la destilacion seca del cuerno de ciervo; rectifíquese por medio de otra destilacion, en aparato de vidrio, obteniendo las tres cuartas partes de su peso; y consérvese en frascos pequeños de vidrio negro y bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante y antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos), en pocion.*

SOLUCION DE CARBONATO POTÁSICO.

Solutum carbonatis potassici.

LOCION ALCALINA.—Lotio alkalina.

Carbonato potásico.	45 gramos.
Agua comun.	690 —

Disuélvase el carbonato en el agua, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y resolutiva.*
USO EXTERNO.—*En locion.*

SOLUCION DE CLORO.

Solutum chlori.

AGUA DE CLORO.—Aqua chlori.

Manganesa pulverizada.	15 gramos.
Ácido clorohídrico de 22°. . . .	60 —

Échese la manganesa en un matraz, colocado en baño de arena y provisto de un embudo de Welther y un tubo que comunique con un aparato de Woulf, el cual esté compuesto de un frasco de locion con corta cantidad de agua, otro de saturacion que contenga 1000 gramos de agua destilada, y un tercero con una lechada de cal. Enlodadas bien las junturas, añádase poco á poco el ácido por el embudo; y favorézcase al fin la reaccion con un calor suave, hasta que no se desprenda gas. Desmóntese el

aparato, y guárdese el agua saturada en frascos negros y bien tapados.

Desinfectante. Se emplea, además, tópicamente como detersiva.

SOLUCION DE CLORURO FÉRRICO.

Solutum chloruri ferrici.

PER-CLORURO DE HIERRO LÍQUIDO.—CLORURO FÉRRICO LÍQUIDO.—Perchlorurum ferri liquidum.—Chlorurum ferricum liquidum.

Tómese cloruro férrico; disuélvase en suficiente cantidad de agua destilada, para obtener un líquido que señale 30° B. (1,26 de densidad), y filtrese.

Esta solucion contiene en 100 partes, 27 de cloruro férrico anhidro y 73 de agua.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica, reconstituyente y astringente, segun la dósis y modo de administracion.*

USO EXTERNO.—*Coagulante.*

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE CREOSOTA.

Solutum creosoti.

AGUA DE CREOSOTA.—Aqua creosoti.

Creosota.	2 gramos.
Agua destilada.	345 —

Mézclense en un frasco; agítense hasta que la creosota se haya disuelto, y filtrese la solucion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antipútrida.*
USO EXTERNO.—*En locion.*

SOLUCION DE GOMA ARÁBIGA.

Solutum gummi arabici.

AGUA DE GOMA.—Aqua gummi.

Goma arábiga.	15 gramos.
Agua comun.	690 —

Disuélvase, y cuélese la solucion por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

SOLUCION DE HIPOCLORITO CÁLCICO.

Solutum hypochloritis calcici.

HIPOCLORITO DE CAL LÍQUIDO.—CLORURO DE CAL LÍQUIDO.—Hypochloris calcis liquidus.—Chlorurum calcis liquidum.

Hipoclorito cálcico clorurado de 90°. .	30 gramos.
Agua.	1200 —

Deslíase el hipoclorito en el agua, por trituracion, en un mortero; pásese la mezcla á un frasco; tápese perfectamente, y decántese el líquido claro ó filtrese.—Extemporánea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detersiva.*
Se emplea tambien como desinfectante.

SOLUCION DE HIPOCLORITO SÓDICO.

Solutum hypochloritis sodici.

HIPOCLORITO DE SOSA LÍQUIDO.—CLORURO DE SOSA LÍQUIDO.—LICOR DE LABARRAQUE.—Hypochloris sodæ liquidus.—Chlorurum sodæ liquidum.—Liquor vel aqua ex Labarraque.

Hipoclorito cálcico clorurado de 90°. .	30 gramos.
Carbonato sódico cristalizado. . .	60 —
Agua.	1000 —

Deslíase el hipoclorito en las dos terceras partes del agua, y disuélvase el carbonato en la restante; mézclense los dos líquidos; déjese en reposo la mezcla, y decántese el líquido claro, ó fíltrese. —Extemporánea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detersiva.*
Se emplea, además, como desinfectante.

SOLUCION DE PERMANGANATO DE POTASA.

Solutum permanganatis potassæ.

Permanganato potásico..	10 gramos.
Agua destilada.	500 —

Disuélvase, y consérvese en frascos con tapon esmerilado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiséptica.*

SOLUCION DE PIEDRA DIVINA.

Solutum lapidis divini.

COLIRIO DE PIEDRA DIVINA.—Collyrium lapidis divini.

Sulfato cúprico aluminoso alcanforado. . .	4 gramos.
Agua comun.	690 —

Disuélvase, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
USO EXTERNO.—*En colirio.*

SOLUCION DE PIROFOSFATO SÓDICO-FÉRRICO.

Solutum pyrophosphatis sodici-ferrici.

SOLUCION DE FOSFATO DE HIERRO.—Solutum phosphatis ferri.

Solucion de cloruro férrico de 30°. .	8 gramos.
Agua destilada.	250 —

Mézclese.

Pirofosfato sódico cristalizado. . .	9 —
Agua destilada.	250 —

Disuélvase.

Mézclense las dos soluciones; agítese; déjese por algun tiempo hasta que se aclare el líquido; y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente.*
DÓSIS.—De 10 á 20 gramos (2 $^1/_2$ *á* 5 *dracmas).*

SOLUCION DE POTASA CÁUSTICA.

Solutum potassæ causticæ.

LEJÍA DE POTASA.—Lixivium potassæ.

Prepárese, disolviendo potasa cáustica por la cal en la cantidad suficiente de agua, para que la solucion fria señale 36° en el areómetro de Baumé.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE SOSA CÁUSTICA.

Solutum sodæ causticæ.

LEJÍA DEL JABONERO.—Lixivium opificis saponis.

Prepárese, disolviendo sosa cáustica por la cal en la cantidad suficiente de agua, para que la solucion fria señale 36° en el areómetro de Baumé.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO.

Solutum sulphatis aluminico-potassici.

AGUA ALUMINOSA.—Aqua aluminosa.

Sulfato alumínico potásico.	4 gramos.
Agua de rosas.	500 —

Disuélvase.—Extemporánea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
De uso externo.

SOLUCION DE SULFATO CÚPRICO AMÓNICO.

Solutum sulphatis cuprico-ammonici.

AGUA CELESTE.—AGUA DE COBRE AMONIACAL.—Aqua cœlestis.—Aqua cupri ammoniacalis.

Sulfato cúprico.	0,2 gramos.
Agua destilada.	115 —
Amoniaco líquido.	C. S.

Disuélvase el sulfato en el agua, y añádase poco á poco amoniaco, hasta que el precipitado que se forma al principio, se redisuelva completamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
USO EXTERNO.—*En colirio.*

SOLUCION DE SULFATO ZÍNCICO.

Solutum sulphatis zincici.

INYECCION Ó COLIRIO ASTRINGENTE DE SULFATO DE ZINC.—Injectio vel collyrium astringens sulphatis zinci

Sulfato zíncico.	0,3	gramos.
Agua destilada.	180	—

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
USO EXTERNO.—*En inyeccion y colirio.*

SOLUCION DE SULFATO ZÍNCICO ALUMINOSA.

Solutum sulphatis zincici aluminosum.

AGUA ESTÍPTICA.—Aqua stiptica.

Sulfato zíncico.	De cada cosa...	15 gramos.
— alumínico potásico..		
Agua de rosas.	345	—

Hágase solucion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
De uso tópico.

SOLUCION DE TARTRATO ANTIMÓNICO-POTÁSICO.

Solutum tartratis antimonico-potassici.

AGUA EMETIZADA.—Aqua stibiata.

Tartrato antimónico potásico. .	0,1	gramos.
Agua destilada.	240	—

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emética.*
DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($^1/_2$ *á* 1 *onza*).

—•◇•—

SOLUCION ALCOHÓLICA DE ALCANFOR.

Solutum alcoholicum camphoræ.

ALCOHOL ALCANFORADO.—Alcohol camphoratum.

Alcohol de 90°.	345	gramos.
Alcanfor.	15	—

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*
USO EXTERNO.—*En friccion.*

—•◇•—

SOLUCION ALCOHÓLICA DE IODO.

Solutum alcoholicum iodi.

TINTURA DE IODO.—Tinctura iodi.

Iodo puro.	2	gramos.
Alcohol de 90°.	30	—

Disuélvase, fíltrese, y consérvese el líquido en un frasco bien tapado, fuera de la accion de la luz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante.*

DÓSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 *á* 12 *granos).*

Se usa tambien tópicamente, como excitante, revulsiva y resolutiva.

—◇—

SOLUCION ALCOHÓLICA DE JABON ALCANFORADA.

Solutum alcoholicum saponis camphoratum.

ALCOHOL ALCANFORADO JABONOSO.—LINIMENTO JABONOSO.—Alcohol camphoratum saponaceum.—Linimentum saponaceum.

Alcohol de 90°.	345	gramos.
Jabon de sosa, seco y raspado. . .	60	—
Alcanfor.	22	—

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

USO EXTERNO.—*En friccion.*

—◇—

SOLUCION HIDRO-ALCOHÓLICA DE CLORURO MERCÚRICO.

Solutum hydro-alcoholicum chloruri mercurici.

LICOR DE VAN-SWIETEN.—Liquor ex Van-Swieten.

Cloruro mercúrico. . . .	0,3	gramos.
Agua destilada..	330	—
Alcohol de 90°..	30	—

Disuélvase el cloruro en el alcohol, y añádase el agua.

Cada 30 gramos contiene 25 miligramos de cloruro mercúrico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antisifilítica.*

DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 *á* 4 *dracmas*), *diluidas en líquido apropiado.*

USO EXTERNO.—*En el tratamiento de ciertas dermatosis prurigi-nosas, diluida en agua.*

—•◇•—

SOSA CÁUSTICA POR LA CAL.

Soda caustica ope calcis.

Carbonato sódico cristalizado.	4
Cal viva.	1
Agua..	20

Procédase como en la preparacion de la potasa cáustica por la cal.

Sirve para otros preparados.

—•◇•—

SUCINATO AMÓNICO LÍQUIDO.

Succinas ammonicus liquidus.

ESPÍRITU DE CUERNO DE CIERVO SUCINADO.— Spiritus cornu cervi succinatus.

Acido sucínico.	30	gramos.
Agua destilada.	230	—
Carbonato amónico amoniacal. . .	C. S.	

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el carbonato hasta saturacion, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma).*

—•◇•—

SUERO DE LECHE.

Serum lactis.

Hágase hervir leche reciente en una vasija, que no sea atacada por los ácidos; añádase poco á poco disolucion diluida de ácido tartárico (1 de ácido y 8 de agua), hasta que la leche esté bien cortada y el líquido claro; pásese éste sin expresion por una estameña, y déjese enfriar. Clarifíquese despues, añadiéndole por cada 690 gramos la clara de un huevo batida en agua, haciéndole hervir, y filtrándole por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante y diurética.*

DÓSIS.—De 180 á 240 gramos (6 *á* 8 *onzas).*

—•◇•—

SUERO TAMARINDADO.

Serum lactis tamarindatum.

Suero de leche.	345 gramos.
Tamarindos privados de las semillas y restos vegetales.	30 —

Hágase hervir en vasija de porcelana ó de loza, y fíltrese por papel.

ACCION TERAPÉUTICA:—*Laxante.*

DÓSIS.—De 180 á 240 gramos (6 *á* 8 *onzas).*

—•◇•—

SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO.

Sulphas aluminico-potassicus.

ALUMBRE PURIFICADO.—Alumen purificatum.

Procédase como en la purificacion del acetato plúmbico, empleando en vez de la sal de Saturno el alumbre del comercio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓSIS.—De 1 á 3 decigramos (2 *á* 6 *granos).*

USO EXTERNO.—*En polvo y en disolucion, poniendo en este caso de* 1 *á* 20 *centigramos por* 30 *gramos de escipiente.*

—•◇•—

SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO ANHIDRO.

Sulphas aluminico-potassicus anhydrus.

ALUMBRE CALCINADO.—Alumen calcinatum.

Póngase el sulfato alumínico potásico en una vasija de barro sin vidriar, y caliéntese moderadamente hasta que cese el desprendimiento de vapores acuosos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Caterética.*

—•◇•—

SULFATO ATRÓPICO.

Sulphas atropicus.

SULFATO DE ATROPINA.—Sulphas atropinæ.

Atropina..	10
Éter anhidro.	C. S.
Ácido sulfúrico de 66°.	1
Alcohol de 95°..	10

Disuélvase la atropina en el éter; neutralícese la solucion por el ácido sulfúrico, diluido préviamente en el alcohol; recójase el precipitado, que es el sulfato atrópico; deséquese á un calor suave, y guárdese en un frasco bien tapado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante de la inervacion motriz.*

DÓSIS.—*Medio miligramo* ($^1/_{100}$ *de grano); siendo peligroso empezar por dósis mayor.*

—•◇•—

Se usa como dilatante de la pupila, poniendo de 25 *miligramos á* 1 *decigramo por* 30 *gramos de agua, para instilar una ó dos gotas en los ojos; y tambien como colirio y en inyeccion sub-cutánea.*

—•◇•—

SULFATO CINCÓNICO.

Sulphas cinchonicus.

SULFATO DE CINCONINA.—Sulphas cinchoninæ.

Prepárese con la quina de Loja, como el sulfato quínico.

Accion terapéutica.—*Tónico-neurosténica y febrífuga, segun la dósis.*

Dósis.—De 1 á 4 decigramos (2 *á* 8 *granos).*

—•◇•—

SULFATO CÚPRICO.

Sulphas cupricus.

VITRIOLO AZUL PURIFICADO.—Vitriolum cœruleum purificatum.

Procédase como en la purificacion del acetato plúmbico, empleando en lugar de la sal de Saturno el vitriolo azul del comercio.

Accion terapéutica.—*Se ha recomendado como emético, con especialidad en ciertas enfermedades de la laringe.*

Dósis.—De 25 á 50 miligramos (½ *á* 1 *grano*).
Uso externo.—*Irritante y astringente.*

—•◇•—

SULFATO CÚPRICO-ALUMINOSO ALCANFORADO.

Sulphas cuprico-aluminosus camphoratus.

PIEDRA DIVINA Ú OFTÁLMICA.—Lapis divinus seu ophtalmicus.

Sulfato cúprico.	De cada cosa.	180 gramos.
Sulfato alumínico potásico. . .		
Alcanfor en polvo.	8	—

Pónganse en un crisol ó en una cápsula de porcelana las dos sales, préviamente pulverizadas y mezcladas; aplíquese un calor suave para que entren en fusion acuosa; añádase el alcanfor, y viértase la masa fundida sobre una plancha ó perol de cobre.

Accion terapéutica.—*Astringente y resolutiva.*
Uso externo.—*En inyeccion y colirio.*

—•◇•—

SULFATO CÚPRICO-AMÓNICO.

Sulphas cuprico-ammonicus.

SULFATO DE COBRE AMONIACAL.—Sulphas cupri ammoniacalis.

Pulverícese finamente el sulfato cúprico cristalizado; póngase en una campana de vidrio ó en un matraz de cuello largo; añádase amoniaco líquido concentrado, hasta que todo el sulfato

cúprico y el precipitado que al pronto se forman, queden completamente disueltos; échese entonces sobre la solucion amoniacal un volúmen igual al suyo de alcohol de 90°; agítese, y déjese en reposo. Elimínese despues por decantacion el líquido claro; recójase el precipitado azul cristalino que se haya formado; lávese con un poco de alcohol; deséquese rápidamente, comprimiéndole entre papeles absorbentes, y consérvese en frascos con tapon esmerilado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se ha recomendado como antiespasmódico, con especialidad en la epilepsia.*

DÓSIS.—De 12 á 25 miligramos (1/4 á 1/2 *grano*).

SULFATO DE ESERINA.

Sulphas eserinæ.

Habas del calabar.		1000 gramos.
Ácido tartárico.		10 —
Alcohol de 90°.	De cada cosa..	C. S.
Bicarbonato de sosa puro. .		
Éter de 66°.		

Redúzcanse á polvo las habas del calabar; mézclese el ácido tartárico, tambien en polvo, y trátese la mezcla con alcohol varias veces, al calor del baño de maría, hasta obtener todo lo soluble. Reúnanse los líquidos alcohólicos, y destílense para aprovechar el alcohol; caliéntese el resíduo en baño de maría, para desalojar todo el alcohol; deslíese el extracto resultante despues de frio, en cuatro veces su peso de agua destilada, y fíltrese para separar la materia resinosa; añádase al líquido filtrado bicarbonato de sosa, hasta que ofrezca reaccion alcalina; agréguese éter en exceso, agi-

tando varias veces la mezcla, despues del reposo, sepárese por medio de un embudo de llave la capa etérea que contiene la eserina; destílese en baño de maría, á calor muy suave, para aprovechar el éter; y el resíduo, que es la eserina, purifíquese por nuevos tratamientos con éter, y evaporacion espontánea de este líquido.

Disuélvase la eserina en éter de 66°; añádase á la solucion ácido sulfúrico diluido en agua destilada, en la proporcion de 10 por 100, echando gota á gota y agitando hasta que deje de formarse precipitado de sulfato de eserina, y el líquido quede neutro; recójase el precipitado sobre un filtro; séquese en la estufa á 40°; y guárdese en frascos bien tapados.

Sal muy delicuescente y alterable en contacto del aire, tomando coloracion roja.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se emplea para producir la miosis ó contraccion de la pupila, en instilaciones.*

SULFATO ESTRÍCNICO.

Sulphas strychnicus.

SULFATO DE ESTRICNINA.—Sulphas strychninæ.

Estricnina.	1
Agua destilada hirviendo.	5
Acido sulfúrico diluido.	C. S.

Póngase la estricnina pulverizada en una cápsula de porcelana; añádase poco á poco el agua destilada hirviendo, y la cantidad de ácido sulfúrico diluido suficiente para neutralizar el

alcaloide; filtrese la solucion hirviendo, y déjese cristalizar por enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante especial de la inervacion motriz.*
DÓSIS.—De 2 á 4 miligramos ($^1/_{25}$ *á* $^1/_{12}$ *de grano).*

SULFATO FERROSO.

Sulphas ferrosus.

PROTO-SULFATO DE HIERRO.—SAL DE MARTE.—Proto-sulphas ferri.—Sal Martis.

Limaduras de hierro..	1
Ácido sulfúrico de 66°.	1
Agua..	6

Mézclese el ácido con el agua en una cápsula de porcelana; añádanse las limaduras, y cuando la efervescencia sea poco perceptible, hiérvase la mezcla, y concéntrese hasta que señale 32° B.; fíltrese caliente, y déjese cristalizar. Lávense los cristales con alcohol de 90°; séquense con papel absorbente, y consérvense, con intermedio de alcohol de 90°, en frascos perfectamente tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente y astringente.*
DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos).*

SULFATO MAGNÉSICO.

Sulphas magnesicus.

Procédase como en la purificacion del acetato plúmbico, empleando, en vez de la sal de Saturno, la sal catártica del comercio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*
DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (½ *á* 1 *onza).*

—•◇•—

SULFATO MANGANOSO.

Sulphas manganosus.

Bióxido de manganeso finamente pulverizado. Sulfato ferroso puro cristalizado en polvo. .	Partes iguales.

Mézclense exactamente ambas sustancias, y expóngase la materia en un crisol al calor rojo incipiente por espacio de media hora; déjese enfriar; redúzcase á polvo; lixíviese con agua casi hirviendo; fíltrese el líquido, y evapórese en una cápsula de porcelana hasta sequedad; disuélvase la materia salina; fíltrese la solucion, y evapórese lo conveniente hasta que pueda producir cristales.

Es mejor, cuando el líquido se haya reducido á poco volúmen, y que por el enfriamiento no deposite sal, someterle á la evaporacion espontánea en el verano; y en este caso la sal cristaliza con cuatro equivalentes de agua, que es el hidrato más constante.

Cristales de color de rosa. La solucion acuosa no debe dar coloracion azul con el ferrocianuro potásico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se ha recomendado como reconstituyente.*

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 *á* 2 *granos*).

SULFATO MERCÚRICO.

Sulphas mercuricus.

SULFATO DE BIÓXIDO DE MERCURIO.—DEUTO-SULFATO DE MERCURIO.— Sulphas bioxydi hydrargyri.—Deuto-sulphas hydrargyri.

Mercurio puro..	2
Acido sulfúrico de 66°.	3

Pónganse el metal y el ácido en una cápsula de porcelana, colocada en baño de arena; y caliéntese, moderadamente al principio y fuertemente despues, hasta que cese el desprendimiento de todo gas y vapor, y el producto quede reducido á una masa salina seca.

Debe operarse debajo de una buena chimenea ó al aire libre.

Polvo blanco cristalino, soluble sin resíduo en una solucion concentrada de cloruro de sodio.

Sirve para otros preparados.

SULFATO (SUB) MERCÚRICO.

Sub-sulphas mercuricus.

TURBIT MINERAL.—Turpethum minerale.

Póngase sulfato mercúrico seco en una vasija de loza; lávese con quince veces su peso de agua hirviendo; recójase el precipitado amarillo sobre un filtro; séquese en la estufa, y consérvese en frascos de vidrio negro.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante y antisifilítica.*
Usado tópicamente en algunas dermatosis.

SULFATO MÓRFICO.

Sulphas morphicus.

SULFATO DE MORFINA.—Sulphas morphinæ.

Morfina en polvo..	1
Agua destilada.	4
Acido sulfúrico diluido..	C. S.

Póngase la morfina con el agua en una cápsula de vidrio ó de porcelana, colocada en baño de maría; añádase poco á poco la cantidad precisa de ácido sulfúrico diluido para la solucion del alcaloide; fíltrese el líquido, y evapórese para que cristalice; pónganse los cristales en un lienzo; exprímanse suavemente, y séquense á un calor moderado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina.*

DÓSIS.—De 6 á 12 miligramos (1/8 *á* 1/4 *de grano*).

SULFATO POTÁSICO.

Sulphas potassicus.

TÁRTARO VITRIOLADO. — SAL DE DUOBUS. — SAL POLICRESTA. — ARCANO DUPLICADO.—Tartarus vitriolatus.—Sal ex duobus.—Sal polychrestus.—Arcanum duplicatum.

Póngase en una vasija de porcelana ó de loza la cantidad que se quiera de ácido sulfúrico, diluido en treinta veces su peso de agua; neutralícese por cantidad suficiente de carbonato potásico; fíltrese el líquido; concéntrese por evaporacion, y hágasele cristalizar por enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante y diurética.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 *á* 1 *onza*), *como purgante; y de* 2 á 4 gramos (1/2 *á* 1 *dracma*), *como diurética.*

SULFATO QUÍNICO.

Sulphas quinicus.

SULFATO DE QUININA.—Sulphas quininæ.

Quina calisaya.	100
Ácido clorohídrico de 22°.	6
Agua comun.	600

Redúzcase la quina á polvo grueso; póngase en maceracion con el agua y el ácido por veinticuatro horas; hágase hervir despues el líquido por una hora; pásese por un lienzo, con expresion del resíduo, y háganse con este otras dos decocciones, empleando en cada una cuatrocientas partes de agua y tres de ácido. Reúnanse las tres decocciones; precipítense por lechada de cal ó disolucion de carbonato de sosa, añadidas una ú otra en ligero exceso; y despues de agitar bien la mezcla, déjese en reposo por veinticuatro horas.

Pasado este tiempo, elimínese por decantacion el líquido claro; recójase el precipitado sobre un lienzo; séquese en la estufa; pulverícese finamente, y trátese repetidas veces por alcohol de 90°, al calor del baño de maría, hasta que el resíduo insoluble haya perdido completamente el sabor amargo. Filtrense por papel los líquidos alcohólicos; reúnanse en el baño de maría de un alambique; añádase poco á poco, y agitando bien, ácido sulfúrico diluido, hasta que enrojezcan débilmente el papel de tornasol; y destílense hasta obtener todo el alcohol. Déjese enfriar el alambique; échese sobre un lienzo la masa salina de sulfato de quinina, que haya quedado como resíduo en el baño; exprímase para separar el agua madre negra interpuesta; lávese, además, sobre el mismo lienzo con un poco de agua fria; mézclese despues con carbon animal purificado y la cantidad necesaria de agua caliente para formar una masa blanda; y déjese así en maceracion por veinticuatro horas. Trátese despues esta masa por agua hirviendo, en la proporcion puramente necesaria para disolver el sulfato; filtrese el líquido caliente, y déjese cristalizar por enfriamiento.

Pasadas cuarenta y ocho horas, extráigase el agua madre; mézclese con ella la masa salina que hubiere cristalizado sobre el filtro; hiérvase de nuevo, añadiendo más agua, si fuere necesaria para la solucion completa; filtrese, y déjese igualmente cristalizar por enfriamiento. Pónganse las masas cristalinas y

blancas de sulfato de quinina sobre papeles de filtro doblados; cúbranse con otros para defenderlas de la accion de la luz; séquense en la estufa, cuidando de que permanezcan en ella el menor tiempo posible, para que no se eflorezcan; y consérvense en botes bien tapados. Si las segundas aguas madres fuesen en cantidad no despreciable, pueden aprovecharse, precipitando de ellas la quinina por el amoniaco; convirtiéndola otra vez en sulfato, mediante su disolucion en la menor cantidad posible de agua hirviendo, acidulada convenientemente con ácido sulfúrico, y dejando á la solucion cristalizar por enfriamiento.

El sulfato de quinina del comercio ha de someterse á los siguientes ensayos, en comprobacion de su pureza:

1.° Póngase en un tubo de ensayo un gramo de sulfato de quinina con la menor cantidad posible de agua acidulada, para que se disuelva; añádanse 10 gramos de éter puro, agitando fuertemente, y en seguida 2 gramos de amoniaco, agitando de nuevo. Despues del reposo, si el sulfato de quinina es puro, debe aparecer el líquido trasparente y dividido en dos capas, sin ninguna intermedia.

2.° Póngase en un tubo de ensayo un poco de sulfato de quinina, y añádase agua acidulada con ácido sulfúrico, que disolverá completamente la sal, si es pura.

3.° Disuélvase una parte de sulfato de quinina en 60 de alcohol de 56° centesimales, y déjese por espacio de una hora, al cabo de la cual, la solucion debe ser completa.

4.° Póngase una corta cantidad de sulfato de quinina en una copa, y añádase ácido sulfúrico de 66°. La disolucion no ha de tomar color rojo, ni negro, y á lo más un viso amarillento.

5.° Caliéntese un poco de sulfato de quinina sobre una lámina de platino, continuando la accion del calor, hasta que desaparezca el residuo carbonoso. La sal pura no deja ningun residuo fijo.

6.° Calentando el sulfato de quinina con sosa cáustica, no debe desprender olor amoniacal.

7.° Deséquese en la estufa, á la temperatura de 100°, un peso determinado de sulfato de quinina, y pésese despues. El sulfato puro cristalizado no pierde más de 13 á 15 por 100 de agua.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiperiódica y tónico-neurosténica, segun la dósis.*

DÓSIS.—De 1 á 3 decigramos (2 *á* 6 *granos*).

SULFATO (BI) QUÍNICO.

Bi-sulphas quinicus.

BI-SULFATO DE QUININA.—Bi-sulphas quininæ.

Disuélvase sulfato quínico neutro en la cantidad suficiente de ácido sulfúrico diluido en agua; evapórese la disolucion al calor del baño de maría; y déjese enfriar para que cristalice la sal. Las aguas madres dan por nueva evaporacion más cristales.

Soluble en doce partes de agua destilada.

ACCION TERAPÉUTICA Y DÓSIS.—*Como las del sulfato neutro.*

SULFATO SÓDICO.

Sulphas sodicus.

SAL DE GLAUBERO.—Sal Glauberi.

Disuélvase sal de Glaubero del comercio en agua tibia hasta saturacion; fíltrese la solucion; y evapórese para que cristalice.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante y diurética.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($^1/_2$ *á* 1 *onza*), *como purgante;* y de 2 á 4 gramos ($^1/_2$ *á* 1 *dracma*), *como diurética.*

SULFATO ZÍNCICO.

Sulphas zincicus.

Calcínese el vitriolo blanco del comercio al calor rojo en un crisol; trátese el producto con dos veces su peso de agua hirviendo; filtrese el líquido, y concéntrese para que cristalice por enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

USO EXTERNO.—*En inyeccion y colirio, convenientemente disuelto.*

SULFURO ANTIMÓNICO.

Sulphurum antimonicum.

SÚLFIDO ANTIMONIOSO.—ANTIMONIO CRUDO PURIFICADO.—Sulphidum antimoniosum.—Antimonium crudum purificatum.

Redúzcase á polvo fino el antimonio crudo del comercio, y póngase en contacto con el doble de su peso de amoniaco durante algunos dias, agitando con frecuencia; repítanse estas maceraciones con más amoniaco, si es necesario, hasta que el líquido decantado no precipite por el ácido clorohídrico en exceso.

Por este medio sólo se priva al sulfuro antimónico del súlfido arsenioso.

Sirve para otros preparados.

SULFURO ANTIMÓNICO SULFURADO.

Sulphurum antimonicum sulphuratum.

HIDROSULFATO SULFURADO DE ANTIMONIO.—AZUFRE DORADO DE ANTIMONIO.—Hydro-sulphas sulphuratus vel sulphur auratum antimonii.

Tómense las aguas madres del quermes preparado por vía seca (véase quermes mineral, 2.º método); añádaseles poco á poco ácido sulfúrico diluido, hasta que no precipiten; recójase el precipitado; lávese; y despues de seco y tamizado, guárdese en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 5 á 20 centigramos (1 *á* 4 *granos).*

SULFURO FERROSO.

Sulphurum ferrosum.

Limaduras de hierro..	3
Azufre..	2

Introdúzcase la mezcla de estas dos sustancias en un crisol, y caliéntese gradualmente hasta el rojo. Cuando haya cesado el desprendimiento de vapores sulfurosos, y la masa esté completamente fundida, sáquese el crisol del fuego, déjese enfriar, y rómpase para recoger el producto.

Sirve para otros preparados.

SULFURO DE PLOMO.

Sulphurum plumbi.

PLOMO QUEMADO.—Plumbum ustum.

Fúndase plomo en una vasija de barro y añádase, en pequeñas porciones y agitando sin cesar, suficiente cantidad de azufre para que la mezcla quede reducida á un polvo negro.

Sirve para otros preparados.

SULFURO (TRI) POTÁSICO.

Tri-sulphurum potassicum.

HIGADO DE AZUFRE.—SULFURO DE POTASA.—Hepar sulphuris.—Sulphurum potassæ.

Azufre sublimado.	4
Carbonato potásico bien seco.	7

Mézclense exactamente las dos sustancias; introdúzcase la mezcla en un matraz de fondo plano, cuidando de llenar solamente los dos tercios de su capacidad; caliéntese gradualmente en baño de arena, hasta que la materia alcance una fusion completa y tranquila; déjese entonces enfriar; rómpase el matraz para recoger el producto, y consérvese éste en frascos perfectamente tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante. De uso especial en algunas dermatosis.*

DÓSIS—De 1 á 3 decigramos (*2 á 6 granos*).

USO EXTERNO.—*Disuelto, para baño ó locion.*

SULFURO (QUINTI) POTÁSICO.

Quinti-sulphurum potassicum.

Azufre.	De cada cosa pesos iguales.
Carbonato potásico seco. . .	

Mézclense exactamente, y procédase en lo demás como en la preparacion del sulfuro (tri) potásico.

Sirve para otros preparados.

SULFURO (TRI) POTÁSICO LÍQUIDO.

Tri-sulphurum potassicum liquidum.

HÍGADO DE AZUFRE LÍQUIDO.—Hepar sulphuris liquidum.

Disuélvase el tri-sulfuro potásico en suficiente cantidad de agua destilada (1 de sulfuro y 2 de agua próximamente), para obtener un líquido que señale 30° en el areómetro de Baumé; fíltrese la solucion, y consérvese en vasijas bien tapadas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, con especialidad de la piel.*

Se usa como el sulfuro sódico cristalizado.

SULFURO SÓDICO CRISTALIZADO.

Sulphurum sodicum crystallysatum.

Solucion de sosa cáustica por la cal, á 32° B.	2
Sulfuro ferroso.	1
Ácido sulfúrico de 66°.	1
Agua.	3

Póngase la mitad de la solucion de sosa en un frasco de Woulf; hágase pasar por ella todo el gas sulfo-hídrico producido por las cantidades indicadas de sulfuro ferroso, ácido sulfúrico y agua; añádase al líquido saturado la otra mitad de la solucion de sosa, y déjese cristalizar en vasija bien tapada. Recójanse en un embudo los cristales; y cuando hayan escurrido el agua madre interpuesta, consérvense en frascos perfectamente tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, con especialidad de la piel.*
Se usa para preparar baños.

SUPOSITORIO DE ACÍBAR.

Suppositorium aloes.

Acíbar.	2 gramos.
Manteca de cacao.	10 —

Procédase como en el de manteca de cacao, y cuando ésta se halle en disposicion de verterla en los moldes, mézclese con el ací-

bar, reducido á polvo fino; dividiendo la masa en dos supositorios.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante, revulsiva y antihelmíntica.*

SUPOSITORIO DE EXTRACTO DE RATANIA.

Suppositorium extracti rathaniæ.

Extracto de ratania.	2 gramos.
Manteca de cacao.	10 —

Opérese como en el de acíbar, dividiendo la masa en dos supositorios.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

SUPOSITORIO DE MANTECA DE CACAO.

Suppositorium butyri ex cacao.

Manteca de cacao.	12 gramos.

Fúndase en una cápsula de porcelana al calor del baño de maría; déjese enfriar, y cuando esté á punto de solidificarse, viértase en dos moldes de papel de forma cónica prolongada.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

SUPOSITORIO DE MIEL.

Suppositorium mellis.

SUPOSITORIO COMUN.—Suppositorium commune.

Miel.	30 gramos.
Cloruro sódico.	2 —

Evapórese la miel hasta que, enfriada una gota, aparezca sólida y frágil; añádase entonces la sal, finamente pulverizada; mézclese bien; y viértase la mezcla en un cono de papel, impregnado de aceite comun, del tamaño de un dedo pequeño, cuidando de poner en el mismo cono una pequeña cinta doblada, de modo que su extremo quede fuera de la base.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*

SUPOSITORIO DE MIEL COMPUESTO.

Suppositorium mellis compositum.

SUPOSITORIO IRRITANTE.—Suppositorium irritans.

Miel.	30 gramos.
Polvo de cloruro sódico.	2
— de coloquíntidas.	1

Evapórese la miel hasta el grado prescrito para el supositorio

anterior; mézclense despues los polvos, y procédase en lo demás como allí queda indicado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*

TABLETAS DE AZUFRE.

Tabellæ sulphuris.

Azufre sublimado y lavado.	5 gramos.
Azúcar blanco.	30 —
Mucílago de tragacanto, hecho con agua de rosas.. .	C. S.

Háganse cuarenta tabletas.—Cada una contiene 12 centigramos de azufre.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*

DÓSIS.—*De* 1 *á* 2.

TABLETAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

Tabellæ balsami Tolutani.

PASTILLAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ.—Pastilli balsami Tolutani.

Bálsamo de Tolú.	10 gramos.
Agua..	20 —
Azúcar en polvo..	200 —
Mucílago de goma tragacanto.. .	C. S.

Expóngase el bálsamo de Tolú con el agua al calor del baño de maría, agitando la mezcla, durante dos horas; fíltrese caliente;

mézclese la solucion con el azúcar y cantidad suficiente de mucílago; y háganse doscientas tabletas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*
DÓSIS.—*De* 1 *á* 4.

TABLETAS DE BI-BORATO SÓDICO.

Tabellæ bi-boratis sodici.

PASTILLAS DE BORAX.—Pastilli boracis.

Biborato de sosa en polvo. . . .	10 gramos.
Azúcar en polvo.	90 —
Mucílago de goma tragacanto. . .	C. S.

Mézclense bien y háganse cien tabletas.
Cada tableta contiene un decigramo de borax.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante. Se emplean en el tratamiento de las estomatitis.*
DÓSIS.—De 1 *á* 2.

TABLETAS DE CARBON.

Tabellæ carbonis.

PASTILLAS DE CARBON.—Pastilli carbonis.

Carbon vegetal lavado y en polvo fino. .	30 gramos.
Azúcar blanco.	86 —
Mucílago de tragacanto.	C. S.

Háganse cien pastillas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Desinfectante. Usadas para corregir el mal olor del aliento, y en ciertas dispepsias.*

DÓSIS.—De 1 *ó* 2.

TABLETAS DE CARBONATO (BI) SÓDICO.

Tabellæ carbonatis (bi) sodici.

PASTILLAS DE VICHY.—Pastilli ex Vichy.

Carbonato (bi) sódico en polvo. . .	30 gramos.
Azúcar blanco..	520 —
Mucílago de tragacanto.	C. S.

Háganse doscientas cincuenta tabletas.

Cada tableta contiene 12 centigramos de bi-carbonato sódico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante. Se emplean en ciertas dispepsias.*

DÓSIS.—De 2 *á* 6.

TABLETAS DE CLORATO POTÁSICO.

Tabellæ chloratis potassici.

PASTILLAS DE CLORATO DE POTASA.—Pastilli chloratis potassici.

Clorato potásico.	10 gramos.
Azúcar en polvo.	90 —
Mucílago de goma tragacanto, preparado con agua aromatizada con bálsamo de Tolú.	C. S.

Mézclense exactamente, y háganse cien tabletas.
Cada una contiene un decigramo de clorato potásico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante. De uso especial en las estomatitis mercurial, ulcerosa y membranosa.*
DÓSIS.—De 1 *á* 4.

TABLETAS DE CLORURO MERCURIOSO.

Tabellæ chloruri mercuriosi.

PASTILLAS DE CALOMELANOS.—TABLETAS Ó PASTILLAS VERMÍFUGAS.—Pastilli calomelanis.—Tabellæ vermifugæ.—Pastilli vermifugi.

Cloruro mercurioso por el vapor.	4 gramos.
Azúcar blanco en polvo. . . .	45 —
Mucílago de tragacanto. . . .	C. S.

Háganse ochenta tabletas.
Cada una contiene 5 centigramos de cloruro.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antihelmíntica y laxante.*
DÓSIS.—*De* 1 *á* 2 *para los niños.*

TABLETAS DE GOMA.

Tabellæ gummi arabici.

PASTILLAS DE GOMA.—Pastilli gummi.

Polvo de goma arábiga.	200 gramos.
Goma arábiga en grano.	30 —
Azúcar en polvo.	690 —
Agua de azahar.	60 —

Prepárese un mucílago con la goma entera y el agua de azahar; añádase el polvo de goma, préviamente mezclado con el de azúcar, y háganse tabletas de un gramo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

TABLETAS DE IPECACUANA.

Tabellæ ipecacuanhæ.

Polvo de ipecacuana.	4 gramos.
Azúcar blanco.	160 —
Mucílago de tragacanto.	C. S.

Háganse ciento cuarenta tabletas.
Cada una contiene 28 miligramos de polvo de ipecacuana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*
DÓSIS.—*De* 1 *á* 2.

TABLETAS DE MAGNESIA.

Tabellæ magnesiæ.

PASTILLAS DE MAGNESIA.—Pastilli magnesiæ.

Sub-carbonato magnésico.	30 gramos.
Azúcar blanco en polvo.	144 —
Mucílago de tragacanto.	C. S.

Háganse cien tabletas.
Contiene cada una 3 decigramos de carbonato de magnesia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente y antiácida.*
DÓSIS.—*De* 1 *á* 4.

TABLETAS DE MALVABISCO.

Tabellæ althææ.

Polvo de raíz de altea.	60 gramos.
Azúcar puro en polvo.	400 —
Mucílago de goma tragacanto, hecho con agua de flor de azahar.	C. S.

Háganse tabletas de un gramo.
ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

TABLETAS DE SANTONINA.

Tabellæ santoninæ.

PASTILLAS DE SANTONINA.—Pastilli santoninæ.

Santonina.	2 gramos.
Azúcar en polvo.	100 —
Mucílago de goma tragacanto. .	C. S.

Tritúrese bien la santonina con la cuarta parte del azúcar; agréguese el resto y el mucílago, y háganse cien tabletas.
Cada una contiene dos centigramos de santonina.

ACCION TERAPÉUTICA —*Antihelmíntica.*
DÓSIS.—*De* 1 *á* 2.

TANATO PLÚMBICO.

Tannas plumbicus.

TANATO DE PLOMO.—Tannas plumbi.

Disuélvanse por separado ácido tánico y acetato de plomo en agua destilada; añádase la solucion del ácido sobre la del acetato, hasta que deje de formarse precipitado; recójase éste sobre un filtro; lávese; deséquese á 100°, y repóngase en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*
Uso externo.

TANATO QUÍNICO.

Tannas quinicus.

TANATO DE QUININA.—Tannas quininæ.

Interpóngase quinina recien precipitada en agua destilada; caliéntese hasta la ebullicion, añadiendo ácido acético hasta que la solucion tenga reaccion débilmente ácida. Hágase una solucion en agua destilada de ácido tánico, y viértase ésta poco á poco sobre la solucion de acetato de quinina despues de fria, empleando cantidad suficiente para que el precipitado que se forma al principio, se redisuelva completamente; añádase á este líquido bicarbonato de sosa, en la cantidad exactamente necesaria para la neutralizacion; recójase sobre un filtro el precipitado de tanato

de quinina, lávese con agua destilada; deséquese, y por fin, redúzcase á polvo fino.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiperiódica y tónica.*
DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos).*

TARTRATO ANTIMÓNICO POTÁSICO.

Tartras antimonico-potassicus.

TARTRATO DE POTASA Y ANTIMONIO.—TÁRTARO ESTIBIADO.—TÁRTARO EMÉTICO.—Tartras potassæ et antimonii.—Tartarus stibiatus.—Tartarus emeticus.

Óxido de antimonio.	10
Bi-tartrato potásico pulverizado. .	12
Agua destilada.	100

Póngase esta mezcla en una vasija de plata ó de porcelana, hágasela hervir por una hora, agitándola contínuamente, y reemplazando el agua á medida que se evapore; fíltrese el líquido, caliente; evapórese hasta que señale 25° B., y déjesele cristalizar por enfriamiento.

Obténganse nuevos cristales por evaporacion de las aguas madres.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emética y purgante, segun la dósis. De uso especial en ciertas neumonías.*

DÓSIS.—*Como emético,* de 25 á 50 miligramos (1/2 *á* 1 *grano), disuelto en corta cantidad de agua, y repetido con breves intervalos; como purgante,* de 12 á 25 miligramos (1/4 *de grano á* 1/2 *grano), diluido en mayor cantidad de escipiente, y repetido á mayores distancias; y para las neumonías, véase la* Pocion estibio-opiada.

TARTRATO BÓRICO-POTÁSICO.

Tartras borico-potassicus.

CRÉMOR DE TÁRTARO SOLUBLE.—Cremor tartari solubilis.

Crémor tártaro pulverizado. . . .	4
Ácido bórico..	1
Agua destilada.	24

Disuélvase en vasija de plata, á la temperatura de la ebullicion; sosténgase el líquido hirviendo hasta que se haya evaporado la mayor parte; continúese la evaporacion del líquido restante á un calor más suave, hasta que la masa adquiera consistencia de jarabe espeso; viértase entonces sobre platos ó vidrios planos; póngase en la estufa á desecar, y despues sepárese por medio de un cuchillo, para que el producto resulte en laminitas pequeñas trasparentes.

Soluble completamente en agua destilada. Tratado por el alcohol é inflamado éste, no debe tomar color verde.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (½ *á* 1 *onza).*

TARTRATO CÁLCICO.

Tartras calcicus.

Póngase crémor tártaro en un perol estañado, con seis veces su peso de agua; caliéntese hasta la ebullicion; añádase á porciones mármol en polvo fino, hasta que cese la efervescencia; sepárese del fuego; y cuando se haya sedimentado, añádase solucion de cloruro cálcico hasta que no precipite. Échese todo sobre

un lienzo; lávese el tartrato cálcico sobre el mismo, hasta que el agua de locion salga incolora é insípida, y deséquese.

Sirve para preparar el ácido tartárico.

TARTRATO FÉRRICO-POTÁSICO.

Tartras ferrico-potassicus.

Crémor tártaro pulverizado.	1
Agua destilada.	6
Hidrato férrico recien preparado..	C. S.

Póngase el crémor con el agua en una vasija de porcelana; caliéntese la mezcla á la temperatura de 50 á 60°, y añádase hidrato férrico hasta que cese de disolverse; fíltrese entonces el líquido; evapórese á un calor suave hasta consistencia de jarabe espeso; distribúyase despues en platos de loza, ó sobre vidrios planos, y termínese la desecacion en estufa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-reconstituyente.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (*6 á 12 granos*).

TARTRATO POTÁSICO.

Tartras potassicus.

TÁRTARO SOLUBLE.—Tartarum solubile.

Carbonato potásico.	1
Agua hirviendo.	8
Crémor tártaro pulverizado.	C. S.

Disuélvase el carbonato en el agua, en vasija de plata ó de porcelana; hágase hervir la solucion; añádase en porciones el crémor hasta la neutralizacion del líquido; y evapórese en seguida á un calor suave hasta sequedad. Redisuélvase el producto en diez veces su peso de agua fria; fíltrese la solucion; evapórese de nuevo hasta sequedad á un calor muy suave; pulverícese el producto, y guárdese en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante y diurética.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (½ *á* 1 *onza), como purgante; y* de 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma), como diurética.*

TARTRATO SÓDICO-POTÁSICO.

Tartras sodicus-potassicus.

SAL DE SEIGNETTE.— Sal ex Seignette.

Carbonato sódico cristalizado.	1
Agua hirviendo.	6
Crémor tártaro pulverizado.	C. S.

Disuélvase el carbonato en el agua, en vasija de plata ó de porcelana; hágase hervir la solucion; añádase en porciones el crémor hasta la neutralizacion completa; póngase despues un poco más de carbonato sódico, para que el líquido quede alcalino; fíltrese; concéntrese por evaporacion, hasta que señale hirviendo 40° B., y déjese cristalizar por enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante y diurética.*

DÓSIS.—De 15 á 22 gramos (4 *á* 6 *dracmas), como purgante; y* de 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma), como diurética.*

TIMOL.

Thymol.

ÁCIDO TÍMICO.—FENOL TIMÓLICO.—Acidum thymicum.—Phenol thymolicus.

Sométase la esencia de tomillo á un enfriamiento prolongado; sepárense los cristales de la parte líquida; purifíquense; y guárdense en frascos bien tapados.

Cristales gruesos, incoloros, trasparentes, de olor fuerte, parecido al del tomillo, y de sabor picante acre. Fusible á 44°; hierve á 230°; muy poco soluble en agua, y bastante en alcohol, éter, ácido acético, cuerpos grasos y álcalis.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antipútrida y antiséptica.*

Se emplea al exterior en solucion acuosa, poniendo medio gramo (10 granos) *de timol por* 600 *gramos* (libra y media) *de agua destilada.*

TINTURA ACUOSA DE CUASIA AMARGA.

Tinctura aquosa quasiæ amaræ.

Cuasia amarga en virutas. . . .	10 gramos.
Agua..	1000 —

Téngase en maceracion por ocho horas, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y estomacal.*

DÓSIS.—De 90 á 180 gramos (*3 á 6 onzas).*

TINTURA ACUOSA DE GENCIANA.

Tinctura aquosa gentianæ.

Prepárese con la raíz de genciana, como la tinctura acuosa de cuasia amarga.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica.*
DÓSIS.—De 90 á 180 gramos (3 *á* 6 *onzas).*

TINTURA ACUOSA DE QUINA CALISAYA.

Tinctura aquosa quinæ calisayæ.

Quina calisaya gruesamente pulverizada. .	20 gramos.
Agua.	700 —

Ténganse en maceracion por veinticuatro horas, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurostónica.*
DÓSIS.—De 60 á 120 gramos (2 *á* 4 *onzas).*

TINTURA ACUOSA DE QUINA DE LOJA.

Tinctura aquosa quinæ ex Loja.

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura acuosa de quina calisaya.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*

Dósis.—De 60 á 120 gramos (2 *á* 4 *onzas).*

TINTURA ACUOSA DE RUIBARBO.

Tinctura aquosa rhabarbari.

Ruibarbo en polvo grueso.. . . .	20 gramos.
Agua.	700 —

Téngase en maceracion por doce horas, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal y laxante.*

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 *á* 2 *onzas), como estomacal; y la mitad de la fórmula, como laxante.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR.

Tinctura alcoholica aloes.

Acíbar en polvo.	30 gramos.
Alcohol de 90°.	150 —

Ténganse en maceracion por ocho dias en un frasco de vidrio tapado, y fíltrese despues el líquido.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos ($^1/_2$ *escrúpulo á media dracma).*

Se usa tambien tópicamente, como excitante y anticariosa.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR COMPUESTA.

Tinctura alcoholica aloes composita.

ELIXIR DE PROPIEDAD.—Elixir proprietatis.

Polvo de acíbar.	De cada cosa...	30 gramos.
— de mirra.		
Azafran	15	—
Alcohol de 90°.	520	—

Ténganse en maceracion por ocho dias, en vasija de vidrio bien tapada, agitando la mezcla de cuando en cuando; y filtrese el líquido por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-estomacal.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo ($^1/_2$ *á* 1 *escrúpulo*), *en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR Y RUIBARBO.

Tinctura alcoholica aloes et rhabarbari.

ELIXIR DE LARGA VIDA.—Elixir longæ vitæ.

Acíbar.		35 gramos.
Raíz de genciana.. . . .		
Ruibarbo.		
Zedoaria.		
Azafran.	De cada cosa..	4 —
Agárico blanco.		
Electuario teriacal magno.		
Alcohol de 60°..	1730	—

Macérense todas las sustancias, convenientemente divididas, en la mitad del alcohol, por espacio de ocho dias; y filtrese por un lienzo, con expresion del resíduo. Hágase con este y el resto del alcohol nueva maceracion por otros ocho dias; reúnanse los dos líquidos, y filtrense por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-estomacal, y purgante.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos (½ *escrúpulo á media dracma), como estomacal; y* de 4 á 16 gramos (1 *á* 4 *dracmas), como purgante, en pocion.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÓNITO.

Tinctura alcoholica aconiti.

Hojas frescas de acónito..	De cada cosa partes iguales.
Alcohol de 90°..	

Contúndanse las hojas en un mortero de piedra; pónganse en maceracion con el alcohol por diez dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo, y filtrese despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina, y empleada tambien como sedante de la inervacion cardio-vascular.*

DÓSIS.—De 2 decigramos (4 *granos), aumentando gradualmente hasta* 6 decigramos (12 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE AJENJO.

Tinctura alcoholica absinthii.

Ajenjo.	30 gramos.
Alcohol de 60°.	150 —

Ténganse en maceracion por diez dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo, y fíltrese por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-estomacal y vermífuga.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ALMIZCLE.

Tinctura alcoholica moschi.

Almizcle.	1
Alcohol de 60°.	25

Tritúrese el almizcle con el alcohol en un mortero de vidrio; déjese en contacto, en un frasco tapado, durante ocho dias, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*
DÓSIS.—De 30 á 50 centigramos (6 *á* 10 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ÁRNICA.

Tinctura alcoholica arnicæ.

Prepárese con la flor seca de árnica, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y astringente.*
Usada por lo comun exteriormente.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ASAFÉTIDA.

Tinctura alcoholica assafœtidæ.

Prepárese con la asafétida, como la tintura alcohólica de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*
Se usa generalmente en enemas.

TINTURA ALCOHÓLICA DE AZAFRAN.

Tinctura alcoholica croci.

Prepárese con el azafran, como la tintura alcohólica de ajenjo

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, antiespasmódica y emenagoga.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

Tinctura alcoholica balsami tolutani.

Prepárese con el bálsamo de Tolú, como la tintura alcohólica de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, con especialidad de las membranas mucosas.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos (½ *escrúpulo á media dracma).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE BELEÑO.

Tinctura alcoholica hyosciami.

Prepárese con la hoja seca de beleño, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante.*

DÓSIS.—De 20 á 40 centigramos (4 *á* 8 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE BELLADONA.

Tinctura alcoholica belladonnæ.

Prepárese con la hoja seca de belladona, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica y calmante.*

DÓSIS.—De 2 decigramos (4 *granos*), *aumentando gradualmente hasta* 6 decigramos (12 *granos*).

TINTURA ALCOHÓLICA DE BENJUÍ.

Tinctura alcoholica benzoini.

Prepárese con el benjuí en polvo grueso, como la tintura alcohólica de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante. Se emplea especialmente para favorecer la cicatrizacion de las heridas y úlceras.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CANELA.

Tinctura alcoholica cinnamomi.

Canela quebrantada.	30 gramos.
Alcohol de 80°.	150 —

Ténganse en maceracion por diez dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante-aromática.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma*), *en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CANTÁRIDAS.

Tinctura alcoholica cantharidum.

Polvo de cantáridas..	30 gramos.
— de cochinilla.	4 —
Alcohol de 80°.	345 —
Alcohol de canela..	30 —

Ténganse en maceracion por ocho dias, y filtrese el líquido por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*
USO EXTERNO.—*En friccion.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CASTÓREO.

Tinctura alcoholica castorei.

Prepárese con los castóreos, cortados en pedazos, como la tintura alcohólica de almizcle.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CICUTA.

Tinctura alcoholica cicutæ.

Prepárese con la hoja seca de cicuta, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y resolutiva de infartos.*
Uso externo.

TINTURA ALCOHÓLICA DE CLAVO.

Tinctura alcoholica caryophylli aromatici.

Prepárese con el clavo de especia contundido, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*
Usada tópicamente en la caries dentaria.

TINTURA ALCOHÓLICA DE CÓLQUICO.

Tinctura alcoholica colchici.

Prepárese con los bulbos secos de cólquico, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*
DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE COLOMBO.

Tinctura alcoholica columbæ.

Prepárese con el colombo, como la tintura alcohólica de canela.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CORTEZA DE NARANJA.

Tinctura alcoholica corticis aurantii.

Prepárese con la corteza seca de naranja agria, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA —*Excitante y antiespasmódica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE CORTEZA DE NARANJA COMPUESTA.

Tinctura alcoholica corticis aurantii composita.

TINTURA CORROBORANTE DE WHYTT.– Tinctura roborans ex Whytt.

Corteza exterior de naranja fresca.	120	gramos.
Quina de Loja.	60	—
Raíz de genciana.	30	—
Alcohol de 90°.	800	—

Pónganse las materias sólidas, convenientemente divididas, en maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo, y fíltrese despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y excitante.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE DIGITAL.

Tinctura alcoholica digitalis.

Prepárese con las hojas secas de digital, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Regularizadora de la inervacion cardiaca, y diurética.*

DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 *á* 8 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ESCILA.

Tinctura alcoholica scillæ.

Prepárese con los bulbos secos de escila, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE EUCALIPTO.

Tinctura alcoholica eucalypti.

Prepárese con la hoja seca de eucalipto, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA. — *Tónica, y recomendada como antiperiódica.*

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos ($^1/_2$ *á* 1 *dracma).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE GENCIANA.

Tinctura alcoholica gentianæ.

Prepárese con la raíz seca de genciana, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE GENCIANA ALCALINA.

Tinctura alcoholica gentianæ alkalina.

ELIXIR ANTIESCROFULOSO DE PERYLHE.—Elixir antiscrofulosum ex Perylhe.

Raíz de genciana pulverizada. . .	12 gramos.
Carbonato sódico.	4 —
Alcohol de 60°..	345 —

Hágase maceracion por ocho dias; fíltrese por un lienzo, con expresion, y despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-excitante.*
DÓSIS.—De 4 á 8 gramos (1 *á* 2 *dracmas), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE HIPERICON VULNERARIA.

Tinctura alcoholica hyperici vulneraria.

BÁLSAMO CATÓLICO Ó DEL COMENDADOR.—Balsamun catholicum sive Commendatoris.

Sumidades floridas de hipericon contundidas. . .	15 gramos.
Acoro en polvo grueso.	15 —
Benjuí.	140 —
Bálsamo de Tolú.	60 —
Mirra..	15 —
Alcohol de 60°..	1000 —

Pónganse en maceracion, por ocho dias, el hipericon y el acoro en el alcohol; añádanse las demás sustancias, convenientemente divididas; continúese la maceracion por otros ocho dias; pásese despues el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo, y fíltrese por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*
Se usa tópicamente en las heridas.

TINTURA ALCOHÓLICA DE HOJAS FRESCAS DE DIGITAL.

Tinctura alcoholica foliorum recentium digitalis.

Prepárese con la hoja de digital, como la tintura alcohólica de acónito.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Regularizadora de la inervacion cardiaca, y diurética.*
DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 *á* 8 *granos).*
Se usa tambien en friccion.

TINTURA ALCOHÓLICA DE IPECACUANA.

Tinctura alcoholica ipecacuanhæ.

Prepárese con la raíz de ipecacuana, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante y emética, segun la dósis.*
DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos (2 *á* 4 *granos), como expectorante; y* de 5 decigramos á 1 gramo (10 *á* 20 *granos), como emética.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE JABORANDI.

Tinctura alcoholica pilocarpi.

Prepárese con la hoja de jaborandi, como la tintura alcohólica de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética y sialagoga.*
DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos (4 *á* 10 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE LEÑO GUAYACO.

Tinctura alcoholica ligni guajaci.

Prepárese con el leño guayaco, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA.

Tinctura alcoholica myrrhæ.

Prepárese con la mirra, como la tintura alcohólica de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*
Se ha recomendado tópicamente como anticariosa.

TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA UTERINA.

Tinctura alcoholica myrrhæ uterina.

ESENCIA ANTIHISTÉRICA.—Essentia antihisterica.

Mirra.	De cada cosa...	6 gramos.
Asafétida.		
Azafran.		
Castóreo.		
Alcanfor.	4	—
Sesqui-carbonato amónico.	8	—
Aceite pirogenado de sucino.	2	—
Alcohol de 90°.	240	—

Pulverícense las cuatro primeras sustancias; pónganse con las demás y el alcohol en maceracion por ocho dias, y fíltrese el líquido.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo (½ *á* 1 *escrúpulo).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE NUEZ VÓMICA.

Tinctura alcoholica nucis vomicæ.

Prepárese con la nuez vómica, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante de la inervacion muscular.*

Se usa en friccion.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ÓPIO.

Tinctura alcoholica opii.

TINTURA PAREGÓRICA.—Tinctura paregorica.

Opio dividido.	60	gramos.
Azafran.	15	—
Canela de China quebrantada.	8	—
Alcohol de 60°. . . . } De cada cosa...	360	—
Agua destilada. . . . }		

Ténganse en digestion por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo; y fíltrese despues por papel.

A cada gramo corresponden próximamente 8 centigramos de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina, excitante y antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 *á* 12 *granos).*

TINTURA ALCOHÓLICA DE ÓPIO JABONOSA.

Tinctura alcoholica opii saponacea.

BÁLSAMO ANODINO.—Balsamum anodynum.

Jabon de sosa.	30	gramos.
Ópio.	15	—
Alcanfor.	24	—
Azafran.	4	—
Alcohol de 60°	520	—

Pónganse todas las sustancias, convenientemente divididas, en maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo; y fíltrese despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y resolutiva.*
USO EXTERNO.—*En friccion.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE PELITRE.

Tinctura alcoholica pyrethri.

Prepárese con el pelitre, como la tintura alcohólica de canela

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*
Entra en la composicion de elixires antiodontálgicos.

TINTURA ALCOHÓLICA DE PELITRE COMPUESTA.

Tinctura alcoholica pyrethri composita.

TINTURA ODONTÁLGICA.—Tinctura odontalgica.

Pelitre.		24 gramos.
Rasuras de leño guayaco..		60 —
— de sasafrás..		30 —
Hojas de nicociana.		12 —
Sumidades de tomillo. . / — de orégano. . \	De cada cosa...	8 —
Clavo de especia.		4 —
Alcanfor. . . . . / Ópio. . . . . \	De cada cosa...	2 —
Alcohol de 60°.		1040 —

Divídanse convenientemente todas las sustancias; pónganse en maceracion con el alcohol por doce dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresion del resíduo; y fíltrese despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*
Entra en la composicion de algunos colutorios.

TINTURA ALCOHÓLICA DE QUINA CALISAYA.

Tinctura alcoholica quinæ calisayæ.

Prepárese con la quina calisaya, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (½ *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE QUINA COMPUESTA.

Tinctura alcoholica quinæ composita.

TINTURA ALEXIFARMACA DE HUXHAM.—Tinctura alexipharmaca ex Huxham.

Quina de Loja..	60	gramos.
Corteza exterior de naranja. . . .	15	—
Raíz de serpentaria de Virginia.. .	12	—
Azafran.	5	—
Cochinilla.	2	—
Alcohol de 60°..	460	—

Divídanse convenientemente todas las sustancias sólidas; ténganse en maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el líquido por lienzo, con expresion; y fíltrese despues por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y excitante.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (1/2 *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE QUINA DE LOJA.

Tinctura alcoholica quinæ ex Loja.

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*
DÓSIS.—De 2 á 4 gramos (1/2 *á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE RESINA DE GUAYACO.

Tinctura alcoholica resinæ guayaci.

Prepárese con la resina de guayaco, como la tintura alcohólica de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*
DÓSIS.—De 1 á 4 gramos (1 *escrúpulo á* 1 *dracma), en mistura.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE VALERIANA.

Tinctura alcoholica valerianæ.

Prepárese con la raíz de valeriana, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos (1/2 *escrúpulo á* 1/2 *dracma), en mistura.*

TINTURA ETÉREA DE BELLADONA.

Tinctura ætherea belladonnæ.

Hojas secas de belladona.	10 gramos
Éter de 56°.	50 —

Divídanse las hojas de belladona; colóquense en un aparato de lixiviacion; añádase el éter; lixíviese, y consérvese el producto en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y antiespasmódica.*

DÓSIS.—2 decigramos (4 *granos), aumentando gradualmente hasta medio gramo* (10 *granos).*

TINTURA ETÉREA DE CASTÓREO.

Tintura ætherea castorei.

Castóreo en polvo.	10 gramos.
Éter de 56°.	100 —

Pónganse en maceracion durante diez dias en frasco tapado agitando de cuando en cuando; y filtrese en embudo cubierto.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*
DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos (4 *á* 10 *granos*).

TINTURA ETÉREA DE DIGITAL.

Tinctura ætherea digitalis.

Prepárese con las hojas de digital, como la tintura alcohólica de belladona.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Regularizadora de la inervacion cardiaca, y diurética.*
DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 *á* 8 *granos*).

TINTURA ETÉREA DE VALERIANA.

Tinctura ætherea valerianæ.

Prepárese con la raíz de valeriana, como la tintura etérea de belladona.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica y excitante.*
DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos (4 *á* 10 *granos*).

TREMENTINA COCIDA.

Terebinthina cocta.

Póngase trementina de abeto en una vasija con agua; hágase hervir hasta que, echando un poco de la masa en agua fria, tome consistencia sólida; sáquese entonces toda la resina, y despues de malaxada ligeramente, guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, con especialidad de las mucosas. Se emplea en las inflamaciones crónicas de las mismas con aumento de secrecion.*

DÓSIS.—De 3 decigramos á 1 gramo (*6 á 20 granos*).

TROCISCOS BALSÁMICOS FUMANTES.

Trochisci balsamici fumidi.

CLAVOS FUMANTES.—Clavi fumidi.

Benjuí.	65	gramos
Incienso.	15	—
Ládano.	4	—
Chacarila.	8	—
Azúcar.	15	—
Nitrato potásico.	8	—
Carbon de tilo ó de pino.	180	—
Tragacanto en polvo.	6	—

Hágase un mucílago espeso con la goma tragacanto y suficiente cantidad de agua; fórmese con este mucílago y las demás sustancias, pulverizadas y mezcladas ántes entre sí, una pasta de consistencia fuerte; y háganse de ella pequeños conos.

Sirve para sahumerio.

TROCISCOS DE CARBONATO PLÚMBICO ALCANFORADOS.

Trochisci carbonatis plumbi camphorati.

TROCISCOS BLANCOS DE RHASIS.—Trochisci albi ex Rhasis.

Albayalde.		45
Almidon.	De cada cosa....	8
Goma arábiga.		
Alcanfor.		2

Pulverícense, finamente y por separado, todas las sustancias; mézclense exactamente; y con suficiente cantidad de agua háganse trociscos.

NOTA.—Cuando se prescriban con ópio, se añadirá 5 centigramos de esta sustancia por cada 12 decigramos del polvo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

USO.—*En colirio é inyeccion, poniendo de* 5 á 10 centigramos (1 *á* 2 *granos) por* 30 gramos *(una onza) de escipiente.*

TROCISCOS DE HIERRO TARTARIZADOS.

Trochisci ferri tartarisati.

GLÓBULOS Ó PERAS MARCIALES.—Globuli martiales.—Pira martialia.

Limaduras de hierro muy finas. . .	30 gramos.
Tártaro rojo en polvo.	120 —
Agua.	C. S.

Pónganse las limaduras con el tártaro en una vasija de hierro;

añádase suficiente cantidad de agua para cubrirlas hasta la altura de un dedo; evapórese en baño de maría hasta sequedad; repítase el mismo tratamiento con el resíduo y nuevas cantidades de agua, hasta que la masa aparezca homogénea y como resinosa; fórmense entonces glóbulos de la figura y tamaño de una pera pequeña, y deséquense á la sombra.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica.*
Usados para hacer agua ferruginosa.

UNGÜENTO BALSÁMICO PERUVIANO.

Unguentum balsamicum peruvianum.

Aceite de olivas.	690	gramos.
Cera amarilla.	345	—
Albayalde.	230	—
Litargirio.		
Pez griega. . . . . De cada cosa...	115	
Jabon de sosa.		
Tierra sellada.		
Bálsamo del Perú líquido. De cada cosa...	60	—

Lícuense la cera y la pez con el aceite; cuélese la mezcla; añádase el jabon raspado y las demás sustancias sólidas, reducidas á polvo muy fino; expóngase todo al fuego, y agítese sin cesar hasta que adquiera color de castaña claro y consistencia de arrope. Apártese del fuego; y cuando la masa esté medio fria, añádase el bálsamo peruviano, y viértase en moldes de papel, para reducirla á pastillas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detersiva y desecante.*

UNGÜENTO DE ALTEA.

Unguentum althææ.

Aceite de altea.		345	gramos.
Cera amarilla.	De cada cosa....	85	—
Resina de pino.			
Trementina de pino.		30	—

Lícuense á un calor suave la cera y la resina con el aceite, añádase la trementina; cuélese por un lienzo, y déjese enfriar agitándolo hasta que adquiera consistencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva.*

UNGÜENTO DE ARRAYAN COMPUESTO.

Unguentum myrti compositum.

UNGÜENTO DE LA C[illegible]ESA.—Unguentum Comitissæ.

Aceite de arrayan.		345	gramos.
Cera amarilla.		30	—
Polvo de agallas.		30	—
— de fruto de arrayan. .			
— de fruto de ciprés. . .	De cada cosa...	8	—
— de corteza de granada .			
— de zumaque.		30	—
— de almáciga.		15	—

Lícuese la cera en el aceite á un calor suave; retírese la mezcla

del fuego; añádanse los polvos, y agítese hasta que por enfriamiento adquiera la consistencia correspondiente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

UNGÜENTO DE ARTÁNITA COMPUESTO.

Unguentum artanitæ compositum.

UNGÜENTO DE PAN DE PUERCO.—Unguentum panis porcini.

Aceite de olivas.		700	gramos.
Rizoma fresco de artánita..		100	—
Fruto de cohombrillo.		50	—
Rizoma de lirio.		50	—
Polipodio.		30	—
Gálbano..		8	—
Asafétida.		8	—
Hiel de toro.		15	—
Grasa de cerdo..	De cada cosa..	230	—
Cera amarilla.			
Polvo de escamonea.			
— de jalapa.	De cada cosa..	15	—
— de coloquíntida. . . .			
— de hojas de mecereon. .			
— de acíbar.			
— de cloruro de sódio. . .	De cada cosa..	8	—
— de euforbio..			
— de mirra..			
— de pimienta larga. . .			
— de jengibre..			
— de flor de manzanilla. .			

Caliéntese el aceite con el rizoma de artánita y cohombrillo, divididos en pedazos, hasta evaporar la humedad; retírese enton-

ces del fuego, y añádanse en seguida el rizoma de lirio, el polipodio, el gálbano, asafétida y hiel de toro; déjese la mezcla durante veinticuatro horas, agitando con frecuencia; cuélese al cabo de dicho tiempo por un lienzo, con fuerte expresion; agréguense la grasa y la cera, calentando lo suficiente para que se fundan estas sustancias; añádanse los polvos, préviamente mezclados entre sí; y agítese sin interrupcion la masa hasta completo enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*

Se recomienda en friccion para los niños, como laxante y antihelmíntico.

UNGÜENTO DE CANTÁRIDAS.

Unguentum cantharidum.

UNGÜENTO EPISPÁSTICO.—Unguentum epispasticum.

Ungüento de colofonia pálido.	90 gramos.
Cera amarilla..	15 —
Polvo de cantáridas..	45 —

Póngase el ungüento con la cera á un calor suave, y cuando la mezcla se haya licuado, retírese del fuego; añádase el polvo de cantáridas, y agítese la masa hasta que por enfriamiento adquiera consistencia semisólida.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante y vesicante.*

UNGÜENTO DE CLORURO MERCÚRICO COMPUESTO.

Unguentum chloruri mercurici compositum.

UNGÜENTO DE ALDERETE.—UNGÜENTO CONTRA LA SARNA.—Unguentum ex Alderete.—Unguentum ad scabiem.

Manteca de vacas.		120	gramos.
Trementina de pino.	De cada cosa...	30	—
Aceite de rosas.			
Cerusa..		75	—
Cloruro mercúrico.	De cada cosa...	8	—
Sulfato alumínico potásico desecado.			
Yemas de huevo.	Dos.		
Ácido cítrico..		6	—

Mézclense en un mortero de piedra las sales, perfectamente pulverizadas; añádase el ácido cítrico, disuelto en cincuenta gramos de agua, y despues las yemas de huevo; y cuando todo esté bien mezclado, incorpórese poco á poco la manteca, la trementina y el aceite, licuados á un calor suavísimo. Agítese de cuando en cuando la mezcla en los dos ó tres dias siguientes, y guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante, detergente y resolutiva.*
Se usa contra la sarna.

UNGÜENTO DE COLOFONIA PÁLIDO.

Unguentum colofoniæ pallidum.

UNGÜENTO BASILICÓN. — UNGÜENTO AMARILLO. — Unguentum basilicum. — Unguentum pallidum.

Cera amarilla.	De cada cosa..	100 gramos.
Sebo de carnero. . . .		
Resina de pino. . . .		
Colofonia.		
Aceite de olivas.	300	—

Háganse licuar todas estas sustancias á un fuego suave; pásese por un lienzo la mezcla licuada; y déjese enfriar, agitándola sin interrupcion hasta que adquiera consistencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y supurativa.*

UNGÜENTO DIGESTIVO ANIMADO.

Unguentum digestivum animatum.

Ungüento digestivo simple. .	De cada cosa...	30 gramos.
Estoraque líquido..		

Mézclense exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, detergente y supurativa.*

UNGÜENTO DIGESTIVO MERCURIAL.

Unguentum digestivum mercuriale.

Ungüento digestivo simple.	De cada cosa. .	30 gramos.
Pomada mercurial doble. .		

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, detergente y resolutiva.*

UNGÜENTO DIGESTIVO SIMPLE.

Unguentum digestivum simplex.

Trementina de pino.	60	gramos.
Yemas de huevo.	Dos.	
Aceite de hipericon.	15	—

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y supurativa.*

UNGÜENTO DE ESTORAQUE.

Unguentum styracis.

Aceite de nueces.		90	gramos.
Estoraque líquido.		60	—
Colofonia.		120	—
Resina elemi.	De cada cosa. .	60	—
Cera amarilla.			

Lícuense las resinas y la cera á un calor suave; añádase el estoraque y el aceite; pásese la mezcla caliente por un lienzo, y agítese hasta que se enfrie.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y detergente.*

UNGÜENTO DE LITARGIRIO.

Unguentum lithargyri.

UNGÜENTO NUTRIDO.—Unguentum nutritum.

Litargirio sutilmente pulverizado..	345	gramos.
Aceite de olivas..	1035	—
Vinagre blanco.	460	—

Pónganse á un fuego suave las tres sustancias en una vasija de barro, agitándolas sin cesar hasta que la mezcla adquiera consistencia de ungüento blando; retírese entonces del fuego, y continúese la agitacion hasta el completo enfriamiento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente y desecante.*

UNGÜENTO DE RESINA DE LIMON.

Unguentum resinæ elemi.

BÁLSAMO DE ARCEO.—Balsamum Arcei.

Sebo de carnero.		360	gramos.
Trementina de pino. . . .	De cada cosa..	300	—
Resina elemi.			
Grasa de cerdo.			

Lícuense á fuego suave; pásese la mezcla fundida por un lienzo; y déjese enfriar, agitándola suavemente para que resulte homogénea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detergente y desecante.*

VALERIANATO QUINICO.

Valerianas quinicus.

VALERIANATO DE QUININA.—Valerianas quininæ.

Disuélvase quinina en la menor cantidad posible de alcohol de 90°; neutralícese la solucion por ácido valeriánico; añádase un volúmen doble de agua destilada, y déjese evaporar á una temperatura de 50°. Recójanse los cristales; deséquense entre papeles absorbentes, y consérvense en frascos bien tapados.

Prismas exagonales, formando masas de aspecto sedoso. Se disuelve en ciento diez partes de agua fria, y en cuarenta de agua hirviendo; muy soluble en alcohol y poco en éter. Calentado sobre una lámina de platino, no debe dejar resíduo. La solucion acuosa no ha de alterar el color del papel de tornasol, y con el cloruro de bario, en disolucion ácida, no debe precipitar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica, antiperiódica y antiespasmódica, segun la dósis.*

DÓSIS.—De 10 á 30 centigramos (2 *á* 6 *granos).*

VALERIANATO ZÍNCICO.

Valerianas zincicus.

Sulfato zíncico.	10
Carbonato sódico cristalizado.	11

Disuélvase el sulfato en tres veces su peso de agua destilada, y el carbonato en cuatro; fíltrense por separado ambas soluciones; hágase hervir la del sulfato, y precipítese por la del carbonato; recójase sobre un lienzo el precipitado de hidrocarbonato de zinc; lávese con agua destilada, hasta que las aguas de locion no se enturbien por el nitrato bárico; trasládese, aún húmedo, á una cápsula de porcelana; satúrese con ácido valeriánico, diluido en doce veces su peso de alcohol de 90°; hágase hervir la mezcla, y fíltrese caliente por papel; lávese varias veces el resíduo del filtro con alcohol hirviendo; recójanse los cristales que se formen por enfriamiento de los líquidos, y evapórense éstos para obtener nuevo producto.

Escamitas brillantes, con lustre nacarado; poco solubles en agua fria; solubles en alcohol y en amoniaco.

Accion terapéutica.—*Antiespasmódica.*

Dósis.—De 10 á 20 centigramos (*2 á 4 granos*).

VERATRINA.

Veratrina.

Pulverícese la cebadilla, y lixíviese el polvo con agua acidulada con un vigésimo de ácido clorohídrico, hasta que los líquidos no produzcan más que un ligero enturbiamiento con el amoniaco. Reúnanse los líquidos, y precipítense con una disolucion de hidrato potásico en ligero exceso; déjense en reposo por algun tiempo; sepárese por decantacion el líquido, y recójase sobre un filtro el precipitado; deséquese éste en la estufa; pulverícese, despues de seco, en un mortero tapado; trátese el polvo con éter de 66° repetidas veces, hasta que algunas gotas de la solucion etérea apénas dejen resíduo, por evaporacion espontánea, en un vidrio de reloj. Reúnanse los líquidos etéreos, y evapórense. Trátese el resíduo semi-sólido con agua acidulada con ácido clorohídrico, y precipítese la solucion con hidrato de potasa. Recójase el precipitado sobre un filtro; lávese con agua destilada, y deséquese en la estufa.

Polvo blanco cristalino, muy soluble en alcohol y en éter, é insoluble en agua. Produce violentos estornudos. El ácido sulfúrico concentrado la comunica un color amarillo al principio, que despues pasa al rojo y violado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se recomienda como contraestimulante y anodina.*

DÓSIS.—De 5 á 25 miligramos ($^1/_{10}$ *de grano á* $^1/_2$ *grano*).

Se usa exteriormente en pomada.

VINAGRE ANTISÉPTICO.

Acetum antisepticum.

VINAGRE DE LOS CUATRO LADRONES.—Acetum quatuor latronum.

Ajenjo.			
Sumidades de romero. .			
— de salvia.. .	De cada cosa. .	45	gramos.
— de menta.. .			
— de ruda. . .			
Sumidades secas de espliego.		60	—
Ajos.		8	—
Pimienta de la Jamáica.		30	—
Vinagre blanco.		2880	—

Contúndanse todas las sustancias; pónganse con el vinagre en digestion por diez dias; pásese despues el líquido por un lienzo, con fuerte expresion, y añádase:

Alcanfor disuelto en suficiente cantidad de alcohol.. . 15 gramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante-aromática.*

Se usa en inhalacion y locion.

VINAGRE DE ALCANFOR.

Acetum camphoræ.

VINAGRE ALCANFORADO.—Acetum camphoratum.

Alcanfor.	10 gramos.
Vinagre blanco.	345 —

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de ácido acético; añádase el vinagre; déjese macerar la mezcla por algunos dias en un vaso cerrado, y fíltrese despues.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica y resolutiva.*
USO EXTERNO.—*En friccion, locion y fomento.*

—•—

VINAGRE DE ALCANFOR COMPUESTO.

Acetum camphoræ compositum.

VINAGRE AROMÁTICO INGLÉS.—Acetum aromaticum anglicanum.

Ácido acético de 8°.	600	gramos.
Alcanfor.	60	—
Esencia de espliego.	0,5	—
— de clavo.	2	—
— de canela.	1	—

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de ácido acético; introdúzcase en un frasco de vidrio con tapon esmerilado; añádanse el resto del ácido y las esencias; y al cabo de

ocho dias, sáquese el líquido por decantacion, y guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante difusiva.*
Se usa comunmente en inhalacion.

VINAGRE DE CÓLQUICO.

Acetum colchici.

Bulbos frescos de cólquico.. . . .	30 gramos.
Vinagre blanco.	360 —

Hágase macerar por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo con expresion; y fíltrese despues por papel.

Sirve para preparar el oximiel de cólquico.

VINAGRE DESTILADO.

Acetum distillatum.

Tómese vinagre, y destílese en aparato de vidrio, hasta que el producto represente las tres cuartas partes del vinagre empleado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Refrigerante.*
USO EXTERNO.—*Repercusivo y detergente.*