

INFLUENCIA DE LA CONDICIÓN CORPORAL DE LA VACA EN EL PESO DE NACIMIENTO Y DESTETE DE LA CRIA EN LA RAZA CRIOLLA ARGENTINA

A.E. RABASA¹; F.D. HOLGADO²

¹ CONICET, EAZ (UNT) Avda Roca 1900, 4000 Tucumán, Argentina

² INTA-CER, Leales, Tucumán, Argentina

La eficiencia reproductiva y la rentabilidad de un establecimiento de cría está influenciada por el porcentaje de vientres que paren y destetan regularmente cada año, y por el peso de los terneros al destete. La condición corporal al parto está asociada a la longitud del ancestro postparto, a la producción de leche, a la incidencia de distocias y al vigor del ternero al nacimiento. La condición corporal de las vacas al inicio de la época de servicios, afecta la reproducción en lo que se refiere a intervalo entre partos y al porcentaje de vacas preñadas (Arias y Slobodzian, 1993). El impacto de la condición corporal en la reproducción ha recibido atención en los últimos años, como lo demuestran numerosos trabajos sobre el tema (Boyles et al, 1992, Arias et al, 2000), no así el efecto de esta variable sobre el peso de las crías. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre la condición corporal de los vientres y el peso de nacimiento y destete de las crías en la raza Criolla Argentina.