

INFUSION DE FLOR DE MALVA.

Infusum floris malvæ.

Prepárese con la flor de malva seca, como la infusion de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

DÓISIS.—De 120 á 240 gramos (4 á 8 onzas).

INFUSION DE FLOR DE SAÚCO.

Infusum floris sambuci.

Prepárese con la flor de saúco, como la infusion de amapola.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*

DÓISIS.—De 120 á 240 gramos (4 á 8 onzas).

INFUSION DE FLOR DE TILO.

Infusum floris tilia.

Prepárese con la flor seca de tilo, como la infusion de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE FLORES CORDIALES.

Infusum florum cordialium.

Prepárese con las especies cordiales, como la infusion de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*

DÓSIS.—De 120 á 240 gramos (4 á 8 onzas)*



INFUSION DE HISOPO.

Infusum hyssopi.

Prepárese con las sumidades secas de hisopo, como la infusion de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



INFUSION DE IPECACUANA.

Infusum ipecacuanhæ.

Raíz de ipecacuana.	2 gramos.
Agua hirviendo.	120 —

Hágase infusion, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emética y expectorante. Empleada en las bronquitis.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

INFUSION DE JABORANDI.

Infusum pilocarpí.

Hojas de jaborandi.	2 gramos.
Agua hirviendo.	120 —

Hágase infusion, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética y sialagoga. Se emplea en las afecciones catarrales y reumáticas.*

DÓSIS.—*La fórmula.*

INFUSION DE MANÁ CARMINATIVA.

Infusum mannæ carminativum.

POCION ANTICÓLICA.—**TISANA ANTICÓLICA.**—**Potio vel Ptisana anticolica.**

Maná.	30 gramos.
Sen.	7 —
Tartrato potásico.	} De cada cosa. 4 —
Anís.	
Agua.	345 —

Infúndanse en el agua hirviendo el sen y el anís; añádanse el maná y el tartrato potásico, y pásese el líquido por estameña, despues de frio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE MANÁ LAXANTE.

Infusum mannæ laxativum.

POCION LAXANTE.—TISANA LAXANTE.—Potio vel Ptisana laxativa.

Maná.	60 gramos.
Sulfato magnésico.	8 —
Sen.	25 —
Agua, cantidad suficiente para 345 gramos de producto.	

Échese el agua hirviendo sobre el sen; añádanse el maná y el sulfato magnésico, para que se disuelvan; y pásese el líquido por estameña, despues de frio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE MANÁ PURGANTE.

Infusum mannæ purgans.

POCION ANGÉLICA.—Potio angelica.

Maná.	90 gramos.
Agua.	240 —
Sen.	12 —
Agua de canela.	1 —

Hágase infusion con el sen y el agua; disolviendo al mismo

tiempo el maná; pásese el líquido por estameña, despues de frio; clarifíquese por ebullicion, con clara de huevo; cuélese otra vez, y añádase el agua de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—*La cantidad de la fórmula en dos veces.*



INFUSION DE MANZANILLA.

Infusum chamomillæ.

Prepárese con la flor de manzanilla, como la infusion de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, tónica y estomacal.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).



INFUSION DE MENTA.

Infusum menthæ.

Prepárese con la menta, como la infusion de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).



INFUSION DE POLÍGALA DE VIRGINIA.

Infusum polygalæ virginianæ.

Polígala de Virginia. 5 gramos.

Agua hirviendo, cantidad suficiente para 690 gramos de producto.

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



INFUSION DE QUINA CALISAYA.

Infusum quinae calisayæ.

Quina calisaya gruesamente pulverizada. . . 15 gramos.

Agua, cantidad suficiente para 690 gramos de producto.

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña, después de frío.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*

DÓSIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).



INFUSION DE QUINA DE LOJA.

Infusum quinæ ex Loja.

Prepárese con la quina de Loja, como la infusion de quina calisaya.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).



INFUSION DE RAÍZ DE ÁRNICA.

Infusum radices arnicæ.

Rizoma de árnica contundida. 4 gramos.

Agua hirviendo. 500 —

Hágase infusion, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante y tónica.*

DÓISIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



INFUSION DE RUIBARBO.

Infusum rhabarbari.

Ruibarbo contundido. 8 gramos

Agua, suficiente cantidad para 240 gramos de producto.

Hágase infusion, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal y laxante.*

DÓISIS.—De 60 á 90 gramos (2 á 3 onzas), como tónica; la cantidad de la fórmula, como laxante.

INFUSION DE SALVIA.

Infusum salviae.

Prepárese con la hoja seca de salvia, como la infusion de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE SAPONARIA.

Infusum saponariae.

Prepárese con la hoja seca de saponaria, como la infusion de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Depurativa.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE SASAFRÁS.

Infusum sassafras.

TISANA DE SASAFRÁS.—Ptisana sassafras.

Sasafrás. 5 gramos.

Agua, suficiente cantidad para 690 gramos de producto

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE TUSÍLAGO.

Infusum tussilaginis.

Prepárese con las hojas secas de tusílago, como la infusión de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE VALERIANA.

Infusum valerianæ.

Raíz de valeriana. 5 gramos.

Agua, cantidad suficiente para 690 gramos de producto.

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INYECCION DE CLORURO DE ZINC.

Injectio chloruri zinci.

Cloruro de zinc.	100
Agua destilada.	200

Disuélvase el cloruro de zinc en el agua, añadiendo unos tres gramos de ácido clorohídrico para facilitar la disolución. Consérvese en frascos bien tapados.

El líquido debe marcar 36° Baumé (1,33 de densidad).

Usos.—*Se emplea para embalsamar los cadáveres.*



INYECCION DE IODO IODURADA.

Injectio iodi iodurata.

Iodo.	10 gramos.
Ioduro potásico.	10 —
Alcohol de 90°.	100 —
Agua destilada.	200 —

Disuélvanse el iodo y el ioduro potásico en el agua destilada, y añádase el alcohol, agitando.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*



INYECCION HIPODÉRMICA DE BISULFATO QUÍNICO.

Injectio bisulphatis quinici.

Bisulfato de quinina cristalizado.	0,5	gramos.
Agua destilada.	6	—

Disuélvase el bisulfato en el agua en mortero de cristal, y filtre.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiperiódica.*

DÓISIS.—*Un gramo para cada inyeccion.*



INYECCION HIPODÉRMICA DE CLORURO MÓRFICO.

Injectio chloruri morphici.

Cloruro mórfico.	0,05	gramos.
Agua destilada.. . . .	4	—

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina.*

DÓISIS.—*De 1/2 á 1 gramo por inyeccion.*



INYECCION IODADA DE VELPEAU.

Injectio iodata ex Velpeau.

Solucion alcohólica de iodo.	15 gramos.
Agua destilada caliente.	100 —

Mézclese y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*

IODOFORMO.

Iodoformium.

IÓDIDO FÓRMICO.—*Iodidum formicum.*

Iodo.	100
Carbonato de potasa.	100
Alcohol de 85°.	C. S.
Agua destilada.	C. S.

Disuélvase el iodo en alcohol de 85°, y el carbonato de potasa en agua destilada, empleando la cantidad suficiente de estos líquidos; fíltrese la disolucion del carbonato, y mézclense las dos disoluciones en un matraz. Calíentese gradualmente la mezcla, á fuego suave, para facilitar reaccion; y cuando el líquido se descolore, añádase poco á poco más iodo en disolucion alcohólica; calentando de nuevo hasta que se descolore. Si se hubiese puesto un

exceso de iodo, añádase disolución de carbonato de potasa hasta que, calentando, se descolore el líquido. Continúese calentando despues, hasta que se evapore la mayor parte del alcohol, y déjese enfriar para que el yodoformo se deposite en forma de cristales laminares, brillantes y de color amarillo; recójanse estos cristales sobre un filtro, lávense sobre el mismo con agua destilada, y deséquense entre papeles absorbentes. Consérvese en frascos bien tapados.

Cristales amarillos de olor fuerte, insolubles en agua y solubles en alcohol y éter. No debe dejar residuo por la accion del calor.

Usos.—*Se emplea al exterior como antiséptico, anestésico y cicatrizante.*

iodo PURIFICADO.

Iodum purificatum.

Introdúzcase iodo del comercio, triturado con una centésima parte de ioduro potásico, en una retorta de cuello corto, colocada sobre un baño de arena, y cubierta con ésta completamente; adáptese como recipiente un frasco grande, sin fondo, colocado horizontalmente y tapado con un vidrio plano; procédase á la sublimacion, mediante un calor gradualmente elevado, y despues de frio recójase el producto.

Soluble completamente en alcohol, y volátil sin residuo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante.*

DÓISIS.—De 12 á 25 miligramos ($\frac{1}{4}$ á $\frac{1}{2}$ grano).

IODURO DE AZUFRE.

Iodurum sulphuris.

Iodo puro.	4
Azufre sublimado.	1

Mézclense íntimamente las dos sustancias por trituración en un mortero de vidrio ó porcelana; introdúzcase la mezcla en un matraz de vidrio; caliéntese, graduando muy lentamente la temperatura; y cuando la masa se haya fundido, inclínese el matraz para recoger, con la masa fundida, las porciones de iodo que se hayan sublimado; y déjese enfriar. Sáquese el producto rompiendo la vasija, y guárdese en frascos bien tapados.

NOTA.—Si se quiere salvar el matraz, échese la masa fundida en moldes de cartulina ó de papel fuerte.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante. De uso especial en algunas dermatosis.*

DÓSIS.—De 25 á 50 miligramos ($\frac{1}{2}$ á 1 grano).

IODURO FERROSO.

Iodurum ferrosium.

PROTO-IODURO DE HIERRO.—Proto-iodurum ferri.

Limaduras de hierro.	1
Iodo puro.	3
Agua destilada.	5

Pónganse las limaduras con el agua en una cápsula de por-

celana, y añádase el iodo en porciones, agitando la mezcla con una espátula de hierro; caliéntese hasta que, perdiendo el líquido el color debido al iodo, presente el verdoso propio de las sales ferrosas; fíltrese y evapórese con rapidez hasta que, echando unas gotas del líquido sobre un cuerpo frío, se solidifiquen; viértase entónces todo sobre una plancha de fundicion ó un plato de loza; y luégo que se solidifique el producto, guárdese en un frasco bien tapado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente y antiescrofulosa.*

DÓISIS.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granos).

IODURO MERCÚRICO.

Iodurum mercuricum.

DEUTO-IODURO Ó BI-IODURO DE MERCURIO.—*Deuto-iodurum vel bi-iodurum mercurii seu hydrargyri.*

Cloruro mercúrico.	4
Ioduro potásico.	5

Disuélvase separadamente el cloruro y el ioduro, en veinte veces su peso de agua destilada cada uno; mézclense las dos soluciones; recójase sobre un filtro el precipitado, de un rojo vivo; lávese bien con agua destilada; y séquese en la estufa resguardado de la luz.

Polvo rojo, insoluble en agua, soluble sin residuo en alcohol caliente, y en una solucion de ioduro potásico; volátil completamente por la accion del calor.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante y antisifilitica.*

DÓISIS.—De 6 á 12 miligramos ($\frac{1}{8}$ á $\frac{1}{4}$ de grano).

IODURO MERCURIOSO.

Iodurum mercuriosum.

PROTO-IODURO DE MERCURIO.—*Proto-iodurum mercurii vel hydrargyri.*

Mercurio puro.	8
Iodo puro.	5

Mézclense en un mortero de vidrio ó de porcelana, añadiendo suficiente cantidad de alcohol de 90° para reducir la mezcla al estado de pasta blanda; tritúrese ésta hasta la extinción del mercurio; lávese el producto con alcohol hirviendo; séquese en estufa al abrigo de la luz, y consérvese en frascos de vidrio negro.

Polvo verde amarillento, insoluble en agua y en alcohol. Tratado con alcohol, filtrando el líquido y evaporando éste á un calor suave sobre todo al final de la evaporacion, no debe quedar residuo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante y antisifilitica.*

DÓSIS.—De 25 á 50 miligramos ($\frac{1}{2}$ á 1 grano).



IODURO PLÚMBICO.

Iodurum plumbicum.

Nitrato plúmbico.	1
Ioduro potásico.	1
Agua destilada.	C. S.

Háganse por separado dos soluciones de las sales con la cantidad suficiente de agua; viértase por porciones la de nitrato plúmbico en la de ioduro potásico; recójase el precipitado sobre un filtro, lávese con agua destilada, deséquese entre papeles absorbentes, y guárdese en frascos al abrigo de la luz.

Polvo amarillo, pesado, soluble en 194 partes de agua hirviendo, de donde se precipita por enfriamiento en forma de laminitas amarillo-doradas. Soluble en la potasa cáustica.

Sirve para otros preparados.

IODURO POTÁSICO.

Iodurum potassicum.

IODOHIDRATO Ó HIDROIODATO DE POTASA.—Iodhydras vel hydriodas potassa.

Disuélvase hidrato potásico puro en la cantidad de agua destilada necesaria para que la solución marque 30° B.; añádase iodo puro poco á poco, hasta saturarla exactamente; evapórese el líquido con el depósito formado, en una cápsula de porcelana, hasta sequedad; fúndase el residuo salino en vasija de hierro colado, teniéndole á la temperatura roja por un cuarto de hora; viértase la masa fundida en una plancha de hierro; disuélvase despues de fria en cuatro veces su peso de agua destilada; fíltrese la solución; evapórese en cápsula de porcelana hasta película fuerte, y déjese enfriar para que cristalice. Obténganse nuevos cristales de las aguas madres.

Debe ser neutro ó muy ligeramente alcalino; completamente soluble en el alcohol de 90°. Su solución acuosa, tratada por un exceso de otra de nitrato argéntico, debe dar un precipitado amarillento, el cual, puesto en contacto

con bastante amoniaco, se vuelve blanco. Filtrado este líquido y neutralizado por el ácido nítrico dá, cuando el producto es puro á lo más una nebulosidad, y un precipitado abundante si el ioduro se halla mezclado con algun cloruro ó bromuro.

La solucion acuosa del ioduro potásico no ha de precipitar con otra de cloruro bárico, ni tomar coloracion rojiza, si se le añade un cristal de ácido tartárico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante y resolutive. De uso especial en el tratamiento de los fenómenos terciarios de la sífilis.*

DÓISIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

JABON ANIMAL.

Sapo animalis.

Grasa de médula de vaca	10
Solucion de sosa cáustica de 36° B.	5
Cloruro sódico.	2

Lícuese la grasa en una cápsula de porcelana á un calor suave; añádase la lejía, y manténgase la mezcla á la temperatura dicha, agitándola continuamente hasta la completa saponificacion; disuélvase el jabon resultante en un peso de agua hirviendo igual al suyo; añádase el cloruro sódico, y téngase la mezcla al fuego el tiempo necesario para disolver la sal; déjese enfriar despues; recójase el jabon que sobrenada en el líquido acuoso; lícuese á un calor suave mediante la adiccion de un poco de agua, y viértase en moldes.

Sirve para otros preparados.

JABON DE SOSA AMIGDALINO.

Sapo sodæ amygdalinus.

JABON MEDICINAL.—*Sapo medicinalis.*

Aceite de almendras dulces.	21
Solucion de sosa cáustica de 36° B.. . . .	10

Póngase el aceite en una cápsula de porcelana; añádase poco á poco la lejía, y agítese para obtener una mezcla exacta; déjese ésta en un sitio cuya temperatura sea de 18 á 20°, agitándola de cuando en cuando hasta que adquiriera una consistencia semi-sólida; viértase entónces en moldes de loza ó de madera, guarnecidos interiormente de papel, y déjese en tal estado hasta que se haya endurecido; sáquese despues de los moldes, y téngase expuesta al aire por espacio de uno ó dos meses, ántes de guardarle para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiácida y resolutive.*

DÓISIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

JABONCILLO AMONICAL.

Saponulus ammoniacalis.

LINIMENTO AMONICAL.—**LINIMENTO VOLÁTIL.**—*Linimentum ammoniacale.*—*Linimentum volatile.*

Aceite de olivas.	30 gramos.
Amoniaco líquido.	4 —

Agítese la mezcla de los dos líquidos en un frasco de vidrio hasta que formen un todo homogéneo.—Extemporáneo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante y resolutive.*

Se usa en friccion.



JABONCILLO AMONIACAL ALCANFORADO.

Saponulus ammoniacalis camphoratus.

Aceite alcanforado.	30 gramos.
Amoniaco líquido.. . . .	4 —

Mézclase y agítese fuertemente en un frasco tapado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y antiespasmódica.*



JALEA DE ARROW-ROOT.

Gelatina amyli maranthæ

GELATINA DE ARROW-ROOT.

Arrow-root.	15 gramos.
Agua.. . . .	230 —
Azúcar blanco.. . . .	45 —

Disuélvase el azúcar en el agua; hágase hervir esta solución; añádase la fécula interpuesta en un poco de agua fría; continúese la ebullicion de la mezcla por algunos minutos, y trasládese caliente á un vaso de vidrio ó de porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Analéptica.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*

JALEA DE CORALINA DE CÓRCEGA.

Gelatina helminthocorton.

GELATINA DE CORALINA DE CÓRCEGA.

Coralina de Córcega.	30 gramos.
Azúcar blanco.	60 —
Vino blanco.	60 —
Cola de pescado.	5 —

Hiérvase la coralina durante una hora en suficiente cantidad de agua, para obtener 200 gramos de líquido; cuélese con expresión; añádase el azúcar, el vino blanco y la cola de pescado, que se habrá macerado previamente en 30 gramos de agua fría; hiérvase hasta consistencia de jalea; pásese por estameña, y colóquese en un lugar fresco.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antihelmíntica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JALEA DE FÉCULA.

Gelatina fœculæ.

GELATINA DE FÉCULA.

Prepárese con la fécula de patata, como la jalea de arrow-root.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—*Analéptica.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*

JALEA DE LÍQUEN.

Gelatina lichenis.

GELATINA DE LÍQUEN.

Líquén.	60 gramos.
Azúcar blanco.	120 —

Prívese al líquén de su principio amargo, lavándole una vez con agua hirviendo y dos veces despues con agua fria; póngase la planta lavada en suficiente cantidad de agua; hiérvase por una hora; pásese el líquido por estameña, con fuerte expresión; añádase el azúcar; evapórese mediante una ebullicion suave, hasta que enfriada una cierta porcion, adquiera consistencia de gelatina; quítese entónces la espuma, y viértase en la vasija en que ha de quedar para el uso.—Deben resultar 240 gramos.

Cuando la prescripcion exprese que se conserve en el medicamento el principio amargo, se omitirán las lociones del líquén.

OTRO MÉTODO:

Jalea de líquén seca.	130 gramos.
Agua.	180 —

Hágase hervir la mezcla hasta reducirla al peso de 240 gramos, y viértase en la vasija en que ha de quedar para el uso.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—*Analéptica; demulcente, cuando se priva al líquén del principio amargo; y tónica, si se le conserva.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*

JALEA DE LÍQUEN CON QUINA.

Gelatina lichenis cum quina.

GELATINA DE LÍQUEN CON QUINA.

Líquén.	60 gramos.
Jarabe de quina.	180 —

Procédase como en la preparacion de la jalea de líquen, sustituyendo al azúcar el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Analéptica y tónica.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*



JALEA DE LÍQUEN SECA.

Gelatina lichenis sicca.

GELATINA DE LÍQUEN SECA.—SACAROLADO Ó SACARURO DE LÍQUEN.—
Saccharolatium vel saccharurum lichenis.

Evapórese la jalea de líquen á fuego suave, sin dejar de agitarla, hasta consistencia espesa; acábase la desecacion en estufa; pulverícese el producto, y guárdese en frascos bien tapados.

Sirve para preparar la jalea de líquen.



JALEA DE SAGÚ.

Gelatina amyli sagi.

GELATINA DE SAGÚ.

Prepárese con el sagú, como la jalea de arrow-root.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Analéptica.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*



JALEA DE TAPIOCA.

Gelatina tapiocæ.

GELATINA DE TAPIOCA.

Prepárese con la tapioca, como la jalea de arrow-root.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Analéptica.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*



JALETINA DE CUERNO DE CIERVO.

Gelatina cornu cervi.

GELATINA DE CUERNO DE CIERVO.

Cuerno de ciervo rasurado y lavado.	170 gramos.
Agua.	1360 —
Azúcar.	85 —
Clara de huevo.	Una.
Zumo de un limon.	

Hiérvase el agua con las rasuras hasta extraer toda la parte gelatinosa; cuélese por lienzo, exprimiendo el residuo; déjese enfriar el líquido; bátase en él la clara de huevo; añádase el azúcar; póngase á hervir, vertiendo el zumo del limon en el momento en que principie el hervor; pásese el líquido clarificado por una estameña, y evapórese hasta la consistencia conveniente.—Deben resultar 345 gramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Analéptica y emoliente.*

DÓISIS.—*A cucharadas.*

JARABE ANTIESCORBÚTICO.

Syrupus anti-scorbuticus.

JARABE DE RÁBANO COMPUESTO.—*Syrupus raphani compositus.*

Zumo antiescorbútico.	345 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos.	620 —

Hágase jarabe por simple solucion, á la temperatura ordinaria.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y antiescorbútica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ACETATO MÓRFICO.

Syrupus acetatis morphici.

JARABE DE ACETATO DE MORFINA.—*Syrupus acetatis morphinæ.*

Acetato mórfico.	0,025 gramos.
Jarabe simple.	60 —

Disuélvase el acetato en la precisa cantidad de agua destilada, y mézclese el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y anodina.*

DÓISIS.—De 7 á 14 gramos (2 dracmas á $\frac{1}{2}$ onza.)

JARABE DE ACHICORIA.

Syrupus cichorii.

Hojas secas de achicoria.	115 gramos.
Agua.	500 —
Azúcar blanco.	690 —

Hágase infusion con la achicoria y el agua; pásese el líquido por estameña con fuerte expresion; añádase el azúcar, y hágase jarabe por coccion y clarificacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ACHICORIA CON RUIBARBO.

Syrupus cichorii cum rhabbaro.

JARABE DE ACHICORIA COMPUESTO.—Syrupus cichorii compositus.

Hojas secas de achicoria.	60 gramos.
Agua hirviendo.	1000 —
Ruibarbo en polvo grueso.	115 —
Azúcar blanco.	1380 —

Infúndanse en el agua las achicorias y el ruibarbo; cuélese el líquido; añádase el azúcar, y hágase jarabe por coccion y clarificación.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante minorativa.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ADORMIDERAS.

Syrupus papaveris albi.

JARABE DIACODION.—*Syrupus diacodion.*

Extracto alcohólico de adormideras. 4 gramos.

Jarabe simple. 345 —

Agua. 30 —

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; y mézclase con el jarabe hirviendo.

Cada 30 gramos contienen las partes solubles de 3 decigramos de extracto.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE AGRAZ.

Syrupus omphacii.

Zumo de agraz. 345 gramos.

Azúcar puro. 620 —

Hágase jarabe por simple solución al calor del baño de maría.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE AJENJO.

Syrupus absinthii.

Ajenjo.	30 gramos.
Agua, cantidad suficiente para. . .	345 —
Azúcar de pilon en pedazos. . . .	620 —

Hágase infusión con el ajeno y el agua; pásese el líquido por estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar, y obténgase el jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y estomacal.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ALTEA.

Syrupus althææ.

Raíz de altea raspada y seca. . . .	25 gramos.
Agua.	145 —
Jarabe simple.	690 —

Córtese la raíz en pedazos pequeños; déjese en maceración en el agua por doce horas; cuélese el líquido sin exprimir; añádase

al jarabe; concéntrese por ebullicion hasta la debida consistencia, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE AMAPOLA.

Syrupus papaveris rubri.

Pétalos secos de amapola.	30 gramos.
Agua, cantidad suficiente para.	690 —
Azúcar de pilon en pedazos.	1240 —

Hágase infusion con la amapola y el agua; pásese por estameña con ligera expresion; déjese sedimentar; añádase el azúcar al líquido, y disuélvase al calor del baño de maría.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE APIO COMPUESTO.

Syrupus apii compositus.

JARABE DE LAS CINCO RAÍCES.—*Syrupus ex quinque radicibus.*

Especies aperitivas.	170 gramos.
Agua.	2000
Azúcar blanco.	1400

Infúndanse las especies aperitivas en el agua hirviendo; pásese

el líquido por estameña, despues de frio; añádase el azúcar, y hágase jarabe por coccion y clarificacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ARTEMISA.

Syrupus artemisiæ.

Prepárese con la hoja seca de artemisa, como el jarabe de ajeno.

Sirve para otros preparados.

JARABE DE AZAHAR.

Syrupus florum aurantiorum.

Agua de azahar.	345 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos.	620 —

Hágase jarabe por simple solucion en frio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza);

JARABE DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

Syrupus balsami tolutani.

JARABE BALSÁMICO.—Syrupus balsamicus.

Bálsamo de Tolú.	60	gramos.
Agua destilada.	240	—
Azúcar de pilon.	450	—

Téngase al calor del baño de maría, en vasija tapada, el bálsamo con el agua por doce horas, y agitando de cuando en cuando; fíltrese el líquido frío; añádase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA — *Modificadora de las flegmasías de las membranas mucosas con aumento de secreción, y expectorante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE BELLADONA.

Syrupus belladonnæ.

Extracto de belladona.	0,1	gramos.
Jarabe simple.	60	—

Disuélvase el extracto en la menor cantidad de agua, y mézclase con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante. Usado con especialidad en el tratamiento de las toses convulsivas.*

DÓISIS.—De 8 á 15 gramos (2 á 4 dracmas).

JARABE DE BREA.

Syrupus picis liquidæ.

Agua de brea.	345 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos.	620 —

•Hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Modificadora de las flegmasías crónicas de las mucosas con aumento de secreción, y especialmente de la del aparato respiratorio.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE BROMURO POTÁSICO.

Syrupus bromuri potassici.

Bromuro potásico.	30 gramos.
Jarabe de azahar.	400 —

Disuélvase el bromuro en la suficiente cantidad de agua destilada, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE CINOGLOSA.

Syrupus cynoglossi.

Corteza de raíz de cinoglosa.	30	gramos.
Extracto de ópio pulverizado.	0,8	—
Tintura alcohólica de castoreo.	99	—
— — de azafran.	7	—
Agua, cantidad suficiente para.	700	— de cocimiento.
Azúcar blanco.	1200	—
	127	

Córtese la cinoglosa en pequeñas porciones, y hiérvase con el agua hasta obtener los 700 gramos de producto; disuélvase el extracto de ópio, y fíltrese; añádase el azúcar, y hágase jarabe por solución al calor del baño de maría; cuélese, y después de frío, agréguese las tinturas.

Cada 15 gramos contienen próximamente un centígramo de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ ú 1 onza).

JARABE DE CITRATO FÉRRICO-AMÓNICO.

Syrupus citratis ferrico-ammonici.

JARABE DE CITRATO DE HIERRO DE BERL.—Syrupus citratis ferri ex Berol.

Citrato férrico amónico.	4	gramos.
Jarabe simple.	115	—

Disuélvase el citrato en la precisa cantidad de agua destilada, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-reconstituyente.*

DÓSIS.—De 7 á 22 gramos (2 á 6 dracmas).

JARABE DE CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL.

Syrupus chlorhydro-phosphatis calcis.

Fosfato cálcico.	15 gramos.
Ácido clorohídrico de 22°.	C. S.
Agua.	380 —
Azúcar de pilon en pedazos.	700 —

Interpóngase el fosfato cálcico en el agua; añádase, poco á poco y agitando, el ácido clorohídrico, en la cantidad exactamente necesaria para disolver el fosfato; fíltrese; y disuélvase el azúcar, á un calor muy suave.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se emplea como reconstituyente, y con especialidad en la diátesis escrofulosa.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE CLORURO FÉRRICO.

Syrupus chloruri ferrici.

Solucion de cloruro férrico.	4 gramos.
Jarabe simple.	250 —

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente y astringente.*

DÓSIS.—De 10 á 30 gramos (3 dracmas á 1 onza).

JARABE DE CLORURO MORFICO.

*Syrupus chloruri morphici.*JARABE DE HIDROCLORATO DE MORFINA.—*Syrupus hydrochloratis morphinæ.*

Prepárese con el cloruro mórfico, como el jarabe de acetato de la misma base.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y anodina.*DÓISIS.—De 7 á 15 gramos (2 dracmas á $\frac{1}{2}$ onza).

JARABE DE CODEINA.

Syrupus codeinæ.

Codeina.	0,1 gramos.
Jarabe simple.	60 —

Disuélvase la codeina en una corta cantidad de agua acidulada con ácido acético, y mézclese la solución con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante.*DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE CORTEZA DE CIDRA.

Syrupus corticis citrei.

Prepárese con el agua de corteza de cidra, como el jarabe de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE CORTEZA DE NARANJA.

Syrupus corticis aurantii.

Prepárese con el agua de corteza de naranja, como el jarabe de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA Y DÓISIS.—*Como el de corteza de cidra.*

JARABE DE CULANTRILLO.

Syrupus Capilli Veneris.

Prepárese con el culantrillo, como el jarabe de ajenojo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emenagoga.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE CHINA COMPUESTO.

Syrupus chinæ compositus.

JARABE ANTIREUMÁTICO.—*Syrupus antirheumaticus.*

China contundida.	} De cada cosa...	85 gramos.
Zarzaparrilla cortada menudamente.		
Rasuras de leño guayaco.	} De cada cosa...	30 —
— de sándalo rojo.		
Azúcar blanco.		1380 —
Agua, suficiente cantidad para 1500 gramos de cocimiento.		

Macérense las raíces y leños en el agua por veinticuatro horas; hiérvanse por una hora; pásese el cocimiento por estameña; añádase el azúcar, y hágase jarabe por coccion y clarificacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética y depurativa.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE DIGITAL.

Syrupus digitalis.

JARABE DE LABELONYE.—*Syrupus ex Labelonye.*

Extracto alcohólico de digital.	0,5 gramos.
Jarabe simple.	300 —

Disuélvase el extracto en la menor cantidad de agua, y mézclese con el jarabe.

Cada 30 gramos de jarabe contienen 5 centigramos de extracto.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Regularizadora de la inervacion cardiaca y diurética.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ESPÁRRAGO.

Syrupus asparagi.

Zumo de espárragos clarificado.	345 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos.	620 —

Hágase jarabe por simple solucion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ÉTER.

Syrupus ætheris.

Jarabe simple.	70	gramos.
Agua destilada.	23	—
Alcohol de 90°.	5	—
Éter.	8	—

Mézclense estas sustancias por agitacion en un frasco.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 7 á 15 gramos (2 dracmas á $\frac{1}{2}$ onza).

JARABE DE EUCALIPTO.

Syrupus eucalypti.

Prepárese con las hojas de eucalipto, como el jarabe de amapola.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica. Recomendado como anti-periódico.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE EXTRACTO DE ÓPIO.

Syrupus extracti opii.

JARABE DE MECONIO.—Syrupus meconii.

Extracto de ópio.	1	gramos.
Agua destilada.	7	—
Jarabe simple.	592	—

Disuélvase el extracto en el agua; filtrese la solución; y mézclase con el jarabe.

Cada 30 gramos de jarabe contienen 5 centigramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina.*

DÓSIS.—De 7 á 30 gramos (2 *dracmas* á 1 *onza*).

JARABE DE FELANDRIO.

Syrupus phellandrii.

Felandrio en polvo grueso.	20 gramos.
Agua hirviendo.	350 —
Azúcar blanco.	630 —

Infúndase el felandrio en el agua durante dos horas; cuélese; y disuélvase el azúcar en la infusión á un calor suave.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmanete de la tos y expectorante.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 *onza*).

JARABE DE FRAMBUESA.

Syrupus rubi idæi.

Azúcar blanco.	1000 gramos.
Frambuesa.	520 —
Agua.	345 —

Disuélvase el azúcar en el agua á un calor suave; añádase la

frambuesa; y despues de un ligerísimo hervor, cuélese sin expresión por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Refrigerante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE FRESA.

Syrupus fragariæ.

Prepárese con la fresa, como el jarabe de frambuesa.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Refrigerante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE FUMARIA.

Syrupus fumarie.

Prepárese con el zumo de fumaria, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Depurativa.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE GENCIANA.

Syrupus gentianæ.

Prepárese con la raíz seca y quebrantada de genciana, como el jarabe de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE GOMA.

Syrupus gummi.

Goma arábica [blanca.	}	Decada cosa... 90 gramos.
Agua.		
Jarabe simple.		690 —

Disuélvase la goma en el agua, en frio; pásese la solución por estameña; mézclese con el jarabe hirviendo; déjese enfriar, y guárdese para el uso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza.)

JARABE DE GRANADA.

Syrupus granatorum.

Prepárese con el zumo de granada, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente y atemperante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE GROSELLA.

Syrupus ribium.

Prepárese con el zumo de grosella, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE HIDRATO DE CLORAL.

Syrupus hydratis chlorali.

Hidrato de cloral.	4 gramos.
Agua destilada.	5 —
Jarabe simple.	90 —

Disuélvase el hidrato de cloral en agua, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Somnifera, calmante y antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 12 á 30 gramos (3 dracmas á 1 onza).

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL.

Syrupus hipophosphitis calcis.

Hipofosfito de cal.	2 gramos.
Jarabe de líquen.	300 —

Disuélvase el hipofosfito en suficiente cantidad de agua destilada, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se emplea en el tratamiento de las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, y especialmente en la tuberculosis.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza),

JARABE DE IODURO FERROSO.

Syrupus ioduri ferrosi.

JARABE DE PROTOIODURO DE HIERRO.—*Syrupus protoioduri ferri.*

Iodo puro.	1,10	gramos
Limaduras de hierro.	0,60	—
Agua destilada.	14	—
Jarabe de goma.	144	—
Jarabe de azahar.	40	—

Póngase el iodo, las limaduras y el agua en un matraz de vidrio, y caliéntese suavemente hasta que el líquido presente color verde; fíltrese por papel; mézclese con el jarabe de goma; y añádase, por último, el jarabe de azahar.—*Extemporáneo.*

Cada 30 gramos de jarabe contienen 2 decigramos de ioduro ferroso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente. De uso especial en la diátesis escrofulosa.*

DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 dracmas á $\frac{1}{2}$ onza).

JARABE DE IODURO POTÁSICO.

Syrupus iodurí potassici.

Ioduro potásico.	10 gramos.
Jarabe de zarzaparrilla.	500 —

Disuélvase el ioduro en suficiente cantidad de agua, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante. De uso especial en los fenómenos terciarios de la sífilis.*

DÓSIS.—De 10 á 30 gramos (3 dracmas á 1 onza).

JARABE DE IPECACUANA.

Syrupus ipecacuanhæ.

Extracto alcohólico de ipecacuana.	2,4 gramos.
Agua destilada.	30
Jarabe simple.	345 —

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; añádase el jarabe simple, y concéntrese el líquido por ebullición hasta que adquiriera la debida consistencia.

Cada 30 gramos de este jarabe contienen 2 decigramos de extracto de ipecacuana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas).

En los niños se usa como emético, de 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas).

JARABE DE JABORANDI.

Syrupus pilocarpi.

Prepárese con las hojas de jaborandi, como el jarabe de amapola.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética y sialagoga. Se emplea en las afecciones catarrales y reumáticas.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE LACTO-FOSFATO DE CAL.

Syrupus lacto-phosphatis calcis.

Lacto-fosfato de cal.	2 gramos.
Jarabe simple.	100 —

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se usa como reconstituyente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE LIMON.

Syrupus limonis.

Prepárese con el zumo de limon, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE LÍQUEN.

Syrupus lichenis.

Líquén.	30 gramos.
Jarabe simple.	1085 —
Agua. Cantidad suficiente.	

Prévase al líquen de su principio amargo, lavándole tres veces con agua caliente á 60°; póngasele despues al fuego con veinte veces su peso de agua; hiérvase el líquido por media hora; pásese por un lienzo, con ligera expresion del residuo; añádase el jarabe simple, y evapórese hasta la debida consistencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE MEMBRILLO.

Syrupus cydonii.

Prepárese con el zumo de membrillo, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE MORAS.

Syrupus mororum.

Prepárese con el zumo de moras, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE PEONÍA.

Syrupus pæonia.

Raíz de peonía contundida. 60 gramos.

Agua, cantidad suficiente para 600 gramos de cocimiento.

Azúcar blanco. 690 gramos.

Hiérvase el agua con la raíz por un cuarto de hora, y pásese el cocimiento por estameña; añádase el azúcar, y hágase jarabe por coccion y clarificacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE PIROFOSFATO SÓDICO-FÉRRICO.

Syrupus pyrophosphatis sodici-ferrici.

JARABE DE FOSFATO DE HIERRO SOLUBLE.—*Syrupus phosphatis ferri solubilis.*

Solucion de pirofosfato sódico-férrico. . . 500 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos. 900 —

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE POLÍGALA DE VIRGINIA.

Syrupus poligalæ virginianæ.

Prepárese con la raíz de polígala de Virginia, como el jarabe de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE QUINA.

Syrupus quinaæ.

Quina de Loja en polvo grueso. . . 115 gramos.
Vino blanco. 1035 —
Alcohol de 90°. 85 —
Azúcar de pilon en pedazos. . . . 1550 —

Macérese la quina, por veinticuatro horas, en la mezcla del vino y alcohol; fíltrese el líquido; añádase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA. — *Tónico-neurosténica.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE QUINA FERRUGINOSO.

Syrupus quinæ ferruginæ.

Jarabe de quina.	200 gramos.
Citrato férrico amoniacal.	$\frac{2}{1}$ —

Disuélvase el citrato en la menor cantidad posible de agua destilada; fíltrese la solución, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente.*

DÓSIS.—De 10 á 20 gramos (2 á 5 dracmas).

JARABE DE RÁBANO IODADO.

Syrupus raphani iodatus.

JARABE ANTIESCORBÚTICO IODADO.—*Syrupus anti-scorbuticus iodatus.*

Iodo.	0,10 gramos.
Ioduro potásico.	0,20 —
Jarabe antiescorbútico.	200 —

Disuélvanse el iodo y el ioduro potásico en la cantidad necesaria de agua destilada, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y alterante. Se emplea con especialidad en el tratamiento de la diátesis escrofulosa.*

DÓISIS.—De 15 á 20 gramos (4 á 6 dracmas).

JARABE DE RATANIA.

Syrupus ratanhiaë.

Extracto de ratania.	12 gramos.
Agua.	115 —
Azúcar de pilon.	220 —

Disuélvase el extracto en el agua, y fíltrese el líquido frio: añádase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE SÍNFITO.

Syrupus symphyti.

Prepárese con la raíz de sínfito, como el jarabe de altea.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE SULFATO ESTRÍCNICO.

Syrupus sulphatis strychnici.

Sulfato de estriçnina.. . . .	0,05 gramos.
Jarabe simple.. . . .	200 —

Disuélvase el sulfato de estriçnina en suficiente cantidad de agua, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante especial de la inervacion motriz.*

DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas).

JARABE DE SULFATO MÓRFICO.

Syrupus sulphatis morphici.

JARABE DE SULFATO DE MORFINA.—Syrupus sulphatis morphinæ.

Prepárese con el sulfato mórfico, como el jarabe de acetato de la misma base.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina.*

DÓSIS.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas).

JARABE DE SULFATO QUÍNICO.

Syrupus sulphatis quiniici.

JARABE DE SULFATO DE QUININA.—Syrupus sulphatis quininae.

Sulfato quínico.	0,3 gramos.
Jarabe simple.	90 —

Disuélvase el sulfato en la cantidad suficiente de agua, ligeramente acidulada con ácido sulfúrico, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-neurosténica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE TARTRATO FÉRRICO POTÁSICO.

Syrupus tartratis ferrico-potassici.

Tartrato férrico potásico. 6 gramos.

Jarabe simple. 200 —

Disuélvase el tartrato en la suficiente cantidad de agua, y mézclese con el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónico-reconstituyente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE TREMENTINA.

Syrupus terebinthinæ.

Prepárese con la trementina de abeto, como el jarabe de bálsamo de Tolú.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y modificador de las inflamaciones crónicas de las mucosas con aumento de secrecion.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE TRIDACIO.

Syrupus tridacii.

Tridacio.	5 gramos.
Agua destilada.	40 —
Jarabe simple.	345 —

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; y mézclese con el jarabe hirviendo.

Cada 30 gramos contienen cerca de 4 decigramos de tridacio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmanete*.

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE TUSÍLAGO.

Syrupus tussilaginis.

Prepárese con las hojas secas de tusílago, como el jarabe de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente*.

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



JARABE DE VINAGRE.

Syrupus aceti.

Prepárese con el vinagre blanco, como el jarabe de agraz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Refrigerante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE VIOLETAS AZUL.

Syrupus violarum cœruleus.

Pétalos de violeta frescos.	200 gramos.
Azúcar de pilon en pedazos.	730 —

Lávense los pétalos con triple cantidad de agua á 45°, y exprímense ligeramente; pónganse despues en una vasija de estaño ó de porcelana con 400 gramos de agua destilada hirviendo; á las ocho horas, pásese con expresion el líquido por un lienzo bien limpio y lavado con agua destilada; déjese sedimentar, y decántese; añádase suficiente cantidad de agua destilada para completar 400 gramos de infusion, y disuélvase en ella el azúcar al calor del baño de maría, empleando vasija de metal estañado ó de porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE VIOLETAS COMUN.

Syrupus violarum communis.

Flor de violeta seca.	80 gramos.
Agua, cantidad suficiente para.	800 —
Azúcar de pilon.	1440 —

Hágase infusion con la violeta y el agua; pásese el líquido por

estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar, y disuélvase á un calor suave.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Emoliente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE YEDRA TERRESTRE.

Syrupus hederæ terrestris.

Prepárese con la hoja seca de yedra terrestre, como el jarabe de ajenjo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ZARZAPARRILLA.

Syrupus sarsaparillæ.

Extracto alcohólico de zarzaparrilla. . .	30 gramos.
Agua.	300 —
Azúcar puro.	540 —

Disuélvase el extracto en el agua al calor del baño de maría; fíltrese el líquido caliente; añádase el azúcar, y hágase jarabe por solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Depurativa.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE DE ZARZAPARRILLA COMPUESTO.

Syrupus sarsaparillæ compositus.

JARABE DE CUISINIER Ó DEL COCINERO.—ROB DE LAFFECTEUR.—Syrupus ex Cuisinier.—Rob ex Laffecteur.

Zarzaparrilla hendida y cortada.	500	gramos.
Flor de borraja.	} De cada cosa....	30 —
— de rosa pálida.. . . .		
Sen.		
Anís.	} De cada cosa....	500 —
Azúcar blanco.. . . .		
Miel blanca.		

Póngase la zarzaparrilla en digestión con 2500 gramos de agua, por veinticuatro horas; hiérvase después el líquido por un cuarto de hora, y pásese por un lienzo, con expresión del residuo. Hágase segunda decocción, por otro cuarto de hora, con este residuo y 2000 gramos de agua, y pásese también el líquido por un lienzo, con expresión. Hágase, por último, tercera decocción con el mismo residuo y otros 2000 gramos de agua; échese este líquido hirviendo sobre la flor de borraja, rosas, anís y sen, colocados previamente en una vasija adecuada; déjese enfriar, y pásese por un lienzo, con fuerte expresión. Reúnanse todos los líquidos, y evapórense hasta que queden reducidos á 1300 gramos; déjense en reposo; decántense para eliminar el sedimento; añádase el azúcar y la miel; y hágase jarabe por cocción y clarificación con clara de huevo, cuidando de pasarle por estameña cuando solo tenga 25° B., y concentrándole después hasta que señale hirviendo 32°.

Cuando se prescriba con cloruro mercuríco, póngase 0,05 por cada 345 gramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Depurativa.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

JARABE SIMPLE.

Syrupus simplex.

Azúcar blanco.	3000 gramos.
Agua comun.	1800 —
Clara de huevo.	Una.

Póngase en un perol el agua y el azúcar, agítese para que se disuelva éste en frio todo lo posible; agréguese la clara de huevo, previamente batida en cantidad suficiente de agua; caliéntese la mezcla gradualmente, y agitando con la espumadera hasta la completa solución del azúcar; hágase, hervir sin agitar; sepárese la espuma; concéntrese hasta que adquiera el punto debido (30° del areómetro Baumé, hirviendo, y 35° á + 15° de temperatura); y cuélese caliente por tela de lana.

OTRO MÉTODO:

Azúcar de pilon en pedazos.	1800 gramos.
Agua.	1000 —

Hágase la solución á la temperatura ordinaria, y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

Sirve para otros preparados.

LACTATO CÁLCICO.

Lactas calcicus.

Leche descremada.	2000	gramos.
Azúcar.	250	—
Creta en polvo.	200	—

Colóquese la leche en vasija adecuada, en sitio fresco y por el tiempo suficiente para que se eleve la grasa ó crema á la parte superior, y sepárese ésta; añádase el azúcar y la creta; déjese la mezcla á una temperatura de 25 á 30° durante unos diez dias, agitando con frecuencia y sin prolongar demasiado la descomposicion, para evitar la fermentacion butírica; hiérvase el líquido para que se coagule la caseina excedente; cuélese por un lienzo; evapórese el líquido resultante hasta consistencia siruposa; déjese enfriar para obtener cristales de lactato de cal; y purifíquese éste por solucion en agua y nueva cristalización.

Sirve para otros preparados.

LACTATO FERROSO.

Lactas ferrosus.

Lactato de cal.	100
Sulfato ferroso cristalizado.	98

Disuélvanse por separado las dos sales en cantidad suficiente de agua destilada; mézclense en una vasija de cristal apropiada; añádase alcohol de 85°, en cantidad próximamente igual á la

cuarta parte del volúmen de la mezcla, para que se precipite todo el sulfato de cal formado; y cuélese el líquido, con expresion del residuo. El líquido filtrado no debe precipitar con el lactato de cal ni con el sulfato ferroso, y en caso contrario, añádase de una u otra salen disolución, lo suficiente, hasta que el líquido filtrado no precipite con ninguna de las dos. Evapórese dicho líquido filtrado en baño de maría hasta que adquiera bastante concentracion, y déjese en una estufa para que cristalice; recójanse los cristales, que se depositarán en forma de costras verdosas; lávensen con alcohol sobre un embudo de cristal, y deséquense entre papeles absorbentes. Las aguas madres dan por evaporacion más cristales, pero resultan bastante coloreados.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente.*

DÓISIS.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos).

LACTO-FOSFATO CÁLCICO.

Lacto-phosphas calcicus.

Tómese fosfato cálcico y hágase una papilla con veinticuatro veces su peso de agua destilada; caliéntese en una cápsula, en baño de maría; añádase poco á poco ácido láctico en cantidad suficiente para que se disuelva; fíltrese y evapórese hasta consistencia de jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se recomienda como reconstituyente.*

DÓISIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

LIMONADA CÍTRICA.

Potio citrica.

Agua comun.	345 gramos.
Ácido cítrico.	1 —
Jarabe de corteza de cidra.	30 —

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante.*

DÓISIS.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

LIMONADA CLOROHÍDRICA.

Potio chlorhydrica.

Agua comun.	345 gramos.
Ácido clorohídrico de 22°.	1 —
Jarabe simple.	30 —

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LIMONADA NÍTRICA.

Potio nitrica.

Agua comun.	345 gramos.
Ácido nítrico de 35°.	0,6 —
Jarabe simple.	30 —

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LIMONADA SULFÚRICA.

Potio sulphurica.

Agua comun.	345	gramos.
Ácido sulfúrico de 66°.	0,5	—
Jarabe simple.	30	—

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LIMONADA TARTÁRICA.

Potio tartarica.

Agua comun.	345	gramos.
Ácido tartárico.	1	—
Jarabé de corteza de cidra.	30	—

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LINIMENTO DE CLOROFORMO.

Linimentum chloroformii.

Cloroformo.	5 gramos.
Aceite de estramonio compuesto.	45 —

Mézclese por agitacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante.*

LINIMENTO OLEO-CALCÁREO.

Linimentum oleo-calcicus.

Agua de cal.	60 gramos.
Aceite de almendras dulces	30 —

Mézclese en frio, por agitacion, en mortero de vidrio ó de porcelana.

Se usa en las quemaduras.

LOOC BLANCO.

Looch album.

Almendras dulces.	30 gramos.
— amargas.	2 —
Azúcar blanco.	15 —
Tragacanto en polvo.	0,5 —
Agua de azahar.	20 —
Agua comun.	120 —

Prepárese con las almendras mondadas, el agua comun y la mayor parte del azúcar una emulsion por el método ordinario; hágase por separado en un mortero con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsion, un mucílago algo claro; incorpórese el resto de la emulsion, poco á poco; y por fin el agua de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

LOOC BLANCO OLEOSO.

Looch album oleosum.

Almendras dulces.	15 gramos.
— amargas.	2 —
Azúcar blanco.	15 —
Aceite de almendra dulce.	15 —
Tragacanto en polvo.	0,8 —
Agua de azahar.	15 —
Agua comun.	120 —

Prepárese con las almendras mondadas, el agua comun y la mayor parte del azúcar, una emulsion por el método ordinario; hágase por separado con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsion, un mucílago algo claro; añádase á este mucílago el aceite, á porciones y agitando vivamente, para que la mezcla resulte homogénea; incorpórese el resto de la emulsion, y por fin el agua de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



MADRE PERLAS PREPARADA.

Mater perlarum preparata.

Tómense conchas de madre perlas, y prepárense como el polvo de ojos de cangrejo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente. Se emplea en las acedías y estados saburrales.*

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos ($\frac{1}{2}$ escrípulo á $\frac{1}{2}$ dracma).



MERCURIO PURO.

Mercurius purus.—Hydrargirum purum.

Mercurio del comercio.	100
Ácido nítrico de 35° B.	2
Agua destilada.	2

Mézclase el ácido con el agua, y póngase con el mercurio en cápsula de porcelana, ó en un frasco de cristal; déjese en contacto durante veinticuatro horas, agitando con frecuencia; decántese el líquido acuoso; lávese el mercurio perfectamente con agua, y séquese con papel absorbente.

Si el mercurio está muy impuro, es necesario destilarle previamente. Para esto, póngase el metal en una retorta de hierro ó de barro, adáptese al cuello de ésta una manga de lienzo, que se su-

merja por el otro extremo en un lebrillo con agua, el cual sirve de recipiente; aplíquese fuego, y cuando todo el mercurio haya destilado, sepárese el agua y séquese con papel absorbente.

Sirve para otros preparados.

MIEL DE MORAS.

Mel mororum.

Zumo de moras negras.	345 gramos.
Miel.	690 —

Mézclese, y hágase hervir la mezcla en vasija de loza ó porcelana hasta que adquiriera consistencia de jarabe espeso; despúmese, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

Uso.—*En colutorio y gargarismo.*

MIEL DE SAÜCO.

Mel sambuci.

Prepárese con el zumo del fruto del saüco, como la miel de moras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diaforética.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

MIEL DEPURADA.

Mel depuratum.

Miel.	100 gramos.
Agua.	335 —

Hágase hervir la mezcla hasta que marque 32° en el areómetro de Baumé; despúmese, y pásese por estameña.

Entra en varios preparados.

MIEL ROSADA.

Mel rosarum.

RODOMIEL.—Rhodomel.

Pétalos de rosa rubra seca.	100 gramos.
Agua hirviendo.	500 —
Miel blanca.	600 —

Infúndanse las rosas en el agua por veinticuatro horas; cuélese el infuso con fuerte expresion; déjese sedimentar; añádase la miel

al líquido claro; hiérvase hasta consistencia de jarabe; despúme-
se, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

Uso.—*En colutorio y gargarismo.*

MISTURA ALCANFORADA.

Mistura camphorata.

JULEPE ALCANFORADO.—*Julapium camphoratum.*

Agua de melisa.	170	gramos
Alcanfor.	0,3	—
Miel de saúco.	42	—

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

MISTURA ALCOHÓLICA.

Mistura alcoholica.

Alcohol de 60°.	60	gramos.
Agua de hisopo.	120	—
Jarabe de diacodion.. . . .	30	—

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante. Se emplea en ciertas inflamaciones agudas del aparato respiratorio.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



MISTURA ALMIZCLADA.

Mistura moschata.

JULEPE MOSCADO.—*Julapium moschatum.*

Azahar.	}		
Azafran cortado menudamente.		De cada cosa..	1 gramos.
Agua.		345	—
Jarabe simple.		42	—
Almizcle.		0,30	—
Carbonato amónico amoniacal.		0,15	—

Hágase infusion con las dos primeras sustancias y el agua; pásese el líquido por estameña; añádase el almizcle, triturado con el carbonato; y mézclese el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).



MISTURA ASTRINGENTE DE SILVIO.

Mistura astringens Sylvii.

Agua destilada.		70	gramos.
Vinagre destilado.		15	—
Opio.		0,1	—
Coral rojo porfirizado.		2	—
Catecú en polvo sutil.		0,6	—
Jarabe simple.		30	—

Tritúrese el ópio con el catecú y el coral; añádase el agua, y por fin el jarabe y el vinagre destilado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

MISTURA BALSÁMICA DE CHOPART.

Mistura balsamica ex Chopart.

Copaiba.	} De cada cosa..	60 gramos.
Alcohol de 90°.		
Jarabe de culantrillo.		
Agua de menta.. . . .		
Éter nitroso alcoholizado.	} De cada cosa..	5 —
Agua de azahar.		

Mézclense el bálsamo de copaiba y el alcohol en la vasija misma en que ha de quedar la mistura; añádanse sucesivamente el jarabe y las aguas destiladas; y, por último, el éter nitroso alcoholizado.

Debe agitarse al tiempo de usarla.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante especial de las membranas mucosas. Usada principalmente en la blenorragia.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

MISTURA DE AMIGDALINA.

Mistura amygdalinæ.

MISTURA DE LIEBIG Y WOHLER.—Mistura ex Liebig et Woehler.

Emulsion comun.	345	gramos.
Amigdalina.	0,85	—

Mézclense.

Contiene esta mistura 5 centigramos de ácido cianhídrico anhidro y 15 centigramos de esencia de almendra amarga.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante. Recomendada especialmente en las afecciones asmáticas.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



MISTURA DE CRETA.

Mistura cretæ.

Creta preparada.	4	gramos.
Agua destilada de manzanilla.	150	—
Jarabe simple.	20	—

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente. Usada en ciertas dispepsias y otras afecciones gástricas é intestinales.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).



MISTURA DE PEPSINA.

Mistura pepsinæ.

ELIXIR DE PEPSINA.—Elixir pepsinæ.

Pepsina medicinal.	15 gramos.
Alcohol de 80°.	40 —
Agua destilada.	130 —
Jarabe de azahar.	120 —

Deslíase la pepsina en el agua, en mortero de cristal; agréguese el jarabe y el alcohol; déjese la mezcla en contacto por algunas horas, agitando de cuando en cuando; y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se recomienda en ciertas dispepsias, y especialmente en las de carácter atónico.*

DÓSIS.—De 7 á 30 gramos (2 dracmas á 1 onza).



MISTURA GOMOSA DE CUERNO DE CIERVO.

Mistura gummosa cornu cervi.

COCIMIENTO DE CUERNO DE CIERVO GOMOSO.—COCIMIENTO BLANCO.—Decoctum cornu cervi gummosum.—Decoctum album.

Cuerno de ciervo calcinado y porfirizado.	15 gramos.
Goma arábica en polvo.	} De cada cosa... 30 —
Azúcar blanco en polvo.	
Agua.	700 —

Mézclense los polvos en mortero de piedra ó de porcelana; añá-

dase el agua poco á poco, y agítese hasta que, mediante la solución de la goma y del azúcar, resulte bien interpuesto el cuerno de ciervo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente y absorbente.*

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

MISTURA VINOSA DE COPAIBA.

Mistura vinosa copaybae.

MISTURA BALSÁMICA DE FULLER.—*Misturá balsamica ex Fuller.*

Copaiba.	15 gramos.
Yemas de huevo.	Dos.
Vino blanco.. . . .	230 —
Jarabe simple.. . . .	60 —

Agítense las yemas con el bálsamo en mortero de vidrio ó porcelana; mézclese el vino poco á poco, y despues el jarabe; y pásese por lienzo, con ligera expresion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante especial de las membranas mucosas.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

MORFINA.

Morphina.

Córtese el ópio en pedazos, y extraíganse todas sus partes solubles en agua por medio de repetidas maceraciones en este líqui-

do. Reúnanse las soluciones; evapórense hasta consistencia de extracto, y redisuélvase éste en agua fría. Pásese por estameña la nueva solución; concéntrese por ebullición hasta que señale 7° B.; añádase un exceso de amoníaco; continúese la ebullición durante diez minutos para expulsar el exceso de álcali; sepárese el líquido del fuego; déjese en reposo por doce horas, y échese sobre un lienzo para recoger la morfina precipitada. Lávese ésta con agua fría; disuélvase en caliente en agua acidulada con ácido clorohídrico, procurando que éste quede en un ligero exceso; y concéntrese la solución para que cristalice el hidrocloreto de morfina. Disuélvase este hidrocloreto en agua; precipítese la morfina por medio del amoníaco; y hágasela, por fin, cristalizar, disolviéndola en alcohol de 90° hirviendo hasta saturación del líquido, y dejando enfriar éste en una vasija tapada.

Si el alcaloide no resultare bastante blanco, redisuélvase en alcohol hirviendo de 90°; añádase un poco de carbon animal; fíltrese el líquido, y déjese cristalizar de nuevo por enfriamiento.

OTRO MÉTODO.—*Véase Codeína.*

La morfina toma color rojo con el ácido nítrico concentrado, y azul con el cloruro férrico. Cuando está pura, apénas se disuelve en agua fría, y necesita 500 partes de agua hirviendo para disolverse. En el éter no se disuelve, separándose la narcotina, que es soluble en este líquido. Una solución de potasa cáustica disuelve la morfina, y deja sin disolver la narcotina. Por último, la morfina pura se quema completamente sobre una lámina de platino, sin dejar residuo, por la acción continuada del calor.

Sirve para varios preparados.



MOSCAS DE MILAN.

*Muscæ mediolanenses.*EMPLASTO VESICANTE DE MILAN.—*Emplastrum vesicans Mediolanense.*

Resina de pino.	} De cada cosa... 30	gramos.
Cera amarilla.		
Cantáridas en polvo.		
Trementina de Venecia.	8	—
Esencia de tomillo.	} De cada cosa... 0,5	—
— de espliego.		

Lícuese la resina y la cera á calor muy suave; agréguese las cantáridas, mezclándolas bien en caliente; añádase la trementina, y retírese del fuego en cuanto se haya mezclado; agítese la masa hasta que se enfríe, añadiendo al fin las esencias. Háganse bolas del peso de un gramo próximamente, envolviéndolas en pedazos de tafetan de 5 á 6 centímetros de diámetro.

Para usarlas, se extiende la masa en el tafetan en el momento de la aplicación.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Vesicante.*

MUCÍLAGO DE GOMA ARÁBIGA.

Mucilago gummi arabici.

Goma arábica en polvo.	30	gramos.
Agua.	90	—

Hágase solución.

Entra en varios preparados.

MUCÍLAGO DE SIMIENTE DE MEMBRILLOS.

Mucilago seminis cydoniorum.

Semillas de membrillo.	5 gramos.
Agua de rosas.	230 —

Déjense en maceracion por dos horas, y pásese el líquido con expresion

Sirve para otros preparados.

NITRATO ARGÉNTICO CRISTALIZADO.

Nitras argenticus crystallisatus.**NITRATO DE PLATA CRISTALIZADO.—Nitras argenti crystallisatus.**

Plata pura en granalla.	1
Acido nítrico de 35°.	2

Pónganse en una cápsula de porcelana, colocada debajo de una chimenea que aspire bien; déjense actuar á la temperatura ordinaria, y facilítese despues la disolucion mediante un suave calor. Evapórese el líquido hasta sequedad; redisuélvase el producto en agua destilada; fíltrese; concéntrese por evaporacion hasta fuerte película, y déjese enfriar para que cristalice. Trasládese á un embudo la masa cristalizada para separarla del agua madre; séquense despues los cristales entre papel absorbente, y guárdense en frascos de vidrio negro bien tapados.

Las aguas madres dan por evaporacion nuevos cristales.

Cristales laminosos, incoloros, solubles en su peso de agua destilada. La

solucion acuosa no debe tomar color azul con el amoniaco; y precipitada por un exceso de ácido hidroclicóricó, el líquido filtrado, no debe dejar residuo ninguno por evaporacion.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se ha recomendado como sustitutivo y astringente en ciertas enfermedades del aparato digestivo.*

DÓISIS.—De 1 á 2 centigramos ($\frac{1}{3}$ á $\frac{2}{3}$ de grano).

Al exterior se usa como astringente y escarótico.



NITRATO ARGÉNTICO FUNDIDO.

Nitras argenticus fusus.

PIEDRA INFERNAL.—*Lapis infernalis.*

Calíentese nitrato argéntico cristalizado, en una cápsula de porcelana con mango, á una temperatura gradualmente elevada, hasta que la sal entre en fusion tranquila; viértase entónces en una rielera, calentada de antemano y perfectamente limpia ó frotada con talco; déjese enfriar; sáquense los cilindros, y consérvense en frascos de vidrio negro bien tapados.

Cilindros blancos ó de color de pizarra y de fractura radiada. Se disuelven en el agua destilada, completamente el blanco, y con un ligero residuo el de color de pizarra.

Se ensaya lo mismo que el nitrato argéntico cristalizado

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica.*



NITRATO (SUB) BISMÚTICO.

Sub-nitras bismuthicus.

MAGISTERIO DE BISMUTO.—Magisterium bismuthi.

Ácido nítrico puro de 35°	3
Bismuto puro en polvo grueso.	1

Póngase el ácido en un matraz, y añádase el bismuto á pequeñas porciones, cuidando de operar debajo de una buena chimenea ó al aire libre. Cuando cese el desprendimiento de vapores nitrosos, déjese sedimentar; decántese el líquido claro ántes que se enfríe; concéntrese por evaporacion en cápsula de porcelana, hasta reducirle á dos tercios de su volúmen; échese despues poco á poco en cuarenta veces su peso de agua destilada, agitando continuamente la mezcla; recójase sobre un lienzo el precipitado blanco formado; lávese con poca agua destilada; séquese en la estufa, y consérvese en frascos bien tapados.

NOTA. Los líquidos de precipitacion y de locion contienen sal bismútica, y pueden aprovecharse para otras operaciones, precipitándolos con amoniaco ó con carbonato de sosa.

Polvo blanco, soluble sin efervescencia en el ácido nítrico. Esta disolucion ácida no debe precipitar con el ácido sulfúrico diluido, el nitrato de plata, nitrato de barita, ni con el molibdato amónico. En el aparato de Marsh no debe dar manchas ni anillos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante de la inervacion del centro epigástrico, astringente y absorbente.*

DÓSIS.—De 3 decigramos á 1 gramo (6 á 20 granos).



NITRATO DE PILOCARPINA.

Nitras pilocarpinæ.

Trátense las hojas de jaborandi divididas, en un aparato de reemplazo, con alcohol de 80°, adicionado de 1 por 100 de ácido clorohídrico, hasta obtener todas las partes solubles; destílese el líquido alcohólico resultante en baño de maría, para aprovechar el alcohol, y evapórese el producto hasta consistencia de masa blanda; trátese ésta con agua destilada; fíltrese, y añádase amoníaco en un ligero exceso; agréguese cloroformo, agitando la mezcla, y despues del reposo sepárese la capa clorofórmica; destílese ésta para aprovechar el cloroformo; el residuo trátese con agua acidulada con ácido nítrico hasta saturacion, fíltrese y evapórese en baño de maría hasta casi sequedad. Purifíquese el nitrato de pilocarpina resultante, por tratamientos sucesivos con alcohol de 90° hirviendo y cristalización.

Cristales prismáticos, anhidros, solubles en 8 partes de agua á 15°, y poco solubles en alcohol en frio.

ACCION TERAPÉUTICA.— *Diaforética y sialagoga.*

DÓISIS.—De 1 á 3 centigramos ($\frac{1}{3}$ á $\frac{3}{3}$ de grano).



NITRATO MERCÚRICO ÁCIDO.

Nitras mercuricus acidus.

NITRATO MERCÚRICO LÍQUIDO.—DEUTO-NITRATO DE MERCURIO LÍQUIDO.—Nitras mercuricus liquidus.—Deuto-nitras hydrargyri liquidus.

Mercurio puro.	1
Ácido nítrico de 35°.	2

Póngase el mercurio con el ácido en una cápsula de porcelana; déjese reaccionar en frío, y caliéntese después hasta reducir el líquido á tres cuartas partes del peso de las sustancias empleadas.

Líquido incoloro de 2,246 de densidad. Diluido en agua, no debe precipitar con el ácido clorohídrico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica.*

NITRATO MERCURIOSO.

Nitras mercuriosus.

PROTO-NITRATO DE MERCURIO.—Proto-nitras hydrargyri.

Pónganse partes iguales de mercurio puro y de ácido nítrico de 25° en una cápsula de porcelana, y abandónense á la reaccion espontánea. Á las veinticuatro horas, sepárense los cristales formados; lávense sobre un embudo con un poco de ácido nítrico diluido; y después de secos, guárdense en frascos bien tapados.

Del agua madre dejada en contacto con el mercurio excedente, á la temperatura ordinaria, pueden obtenerse nuevos cristales.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica.*

Sirve para otros preparados

NITRATO (SUB) MERCURIOSO.

Sub-nitras mercuriosus.

TURBIT NITROSO.—NITRATO MERCURIOSO BIBÁSICO.—*Turpethum nitrosum — Nitras mercuriosus bibasicus.*

Pulverícese en un mortero de vidrio el nitrato mercurioso; añádase diez veces su peso de agua hirviendo, y agítese; recójase sobre un filtro el precipitado amarillo que se forma; lávese con agua fría, y deséquese. Consérvese fuera del contacto de la luz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante, resolutive y antisifilítica.*

DÓISIS.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos).

USO EXTERNO.—*En ciertas dermatosis.*

NITRATO PLÚMBICO.

Nitras plumbicus.

Pónganse en una cápsula de porcelana pedazos de plomo laminado y ácido nítrico de 35° en cantidad suficiente para disolver el metal, primero en frío y despues auxiliando la accion con el calor; déjese enfriar; decántese el líquido claro, y evapórese hasta película para que cristalice por enfriamiento.

Sirve para otros preparados.

NITRATO POTÁSICO.

Nitras potassicus.

NITRO PURO.—Nitrum purum.

Procédase como en la purificación del acetato plúmbico, empleando en vez de la sal de saturno el nitro del comercio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética y antiplástica. Recomendado en el reumatismo.*

DÓISIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), como diurético; de 6 decigramos á 2 gramos ($\frac{1}{2}$ escrúpulo á $\frac{1}{2}$ dracma), como antiplástico y antireumático.

OLEOSÁCARO DE ANÍS.

Eleosaccharum anisi.

Esencia de anís.	0,15 gramos.
Azúcar puro.	4 —

Mézclense exactamente, por trituración, en mortero de vidrio ó de porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y carminativa.*

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos ($\frac{1}{2}$ escrúpulo á media dracma).

OLEOSÁCARO DE CANELA.**Eleosaccharum cinnamomi.**

Prepárese con la esencia de canela, como el oleosácaro de anís.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante.*

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos ($\frac{1}{2}$ *escrúpulo á media dracma*).

OLEOSÁCARO DE HINOJO.**Eleosaccharum feniculi.**

Prepárese con la esencia de hinojo, como el oleosácaro de anís.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante y carminativa.*

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos ($\frac{1}{2}$ *escrúpulo á media dracma*).

OLEOSÁCARO DE MENTA.**Eleosaccharum menthae.**

Prepárese con la esencia de menta, como el oleosácaro de anís.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante aromática.*

DÓISIS—De 6 decigramos á 1 gramo ($\frac{1}{2}$ á 1 *escrúpulo*).

ÓXIDO ANTIMÓNICO.

Oxidum antimonicum.

ÓXIDO ANTIMÓNICO PRECIPITADO.—*Oxidum antimonicum præcipitatum.*

Cloruro antimónico básico.	2
Bicarbonato sódico.	1
Agua destilada.	10

Disuélvase el bicarbonato en el agua; añádase el cloruro, y hágase hervir la mezcla por una hora; decántese el líquido; échese el precipitado sobre un filtro; lávese perfectamente, y séquese.

Sirve para otros preparados.

ÓXIDO FÉRRICO ANHIDRO.

Oxidum ferricum anhydrum.

SESQUI-ÓXIDO Ó PERÓXIDO DE HIERRO.—AZAFRAN DE MARTE ASTRINGENTE.—
Sesqui-oxydum vel peroxydum ferri—Crocus Martis astringens.

Expóngase el hidrato férrico ó el azafran de Marte aperitivo, á la temperatura del rojo oscuro, en un crisol de barro, hasta que pierda toda la humedad; déjese enfriar, y pulverícese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y reconstituyente.*

DÓISIS.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos).

ÓXIDO FERROSO-FÉRRICO.

Oxydum ferroso-ferricum.

ÓXIDO NEGRO DE HIERRO.—ETIOPE MARCIAL.—*Oxydum ferri nigrum.*—*Æthiops martialis.*

Pónganse limaduras de hierro puro en una vasija ancha de barro vidriado; lávense con agua hasta que ésta salga clara; amontónense las limaduras húmedas en el centro de la vasija; déjense expuestas al aire á la temperatura ordinaria; y luego que entre en calor la masa, agítese de cuando en cuando, volviendo á dejarla amontonada, y reemplazando el agua que se consuma. Cuando la masa haya adquirido color negro, dilúyase en agua caliente, y tamícese por locion para recoger el óxido separado de las limaduras; échese sobre un lienzo; exprímase para separar la mayor parte del agua interpuesta; acábese su desecacion al calor de la estufa entre papel absorbente, y guárdese en frasco con tapon esmerilado.

Las limaduras no oxidadas, sometidas al mismo procedimiento, pueden dar nueva cantidad de óxido.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica y reconstituyente.*

DÓISIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).

ÓXIDO MAGNÉSICO.

Oxydum magnesium

MAGNESIA CALCINADA.—MAGNESIA PURA.—MAGNESIA CÁUSTICA.—Magnesia calcinata.—Magnesia pura.—Magnesia caustica.

Póngase subcarbonato magnésico en polvo en una olla de barro refractario de Zamora; cúbrase con una tapadera; calcínese al calor rojo, hasta que una corta cantidad de la magnesia, diluida en agua y ensayada por un ácido, no haga efervescencia; déjese enfriar la olla, y recójase el producto en frascos bien tapados.

Desleído en una corta porción de agua, no ha de aumentar sensiblemente la temperatura del líquido; y añadiendo ácido clorohídrico, se debe disolver completamente sin efervescencia.

Los demás ensayos, como en el carbonato (sub) magnésico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Absorbente, antiácida y laxante.*

DÓISIS.—De 3 decigramos á 1 gramo (6 granos á 1 escrípulo), como absorbente y antiácida; y de 4 á 8 gramos (1 á 2 dracmas), como laxante

ÓXIDO MERCÚRICO AMARILLO.

Oxydum mercuricum flavum.

Cloruro mercúrico.	10
Potasa cáustica pura.	6

Disuélvase por separado estas sustancias en agua destilada; viértase la solución del cloruro poco á poco y agitando sobre la

de potasa; déjese depositar el precipitado amarillo que se forma; lávese con agua varias veces, separando ésta por decantacion; recójase el precipitado sobre un filtro de papel; lávese nuevamente con agua destilada, hasta que las aguas de locion no se enturbien con el nitrato de plata; deséquese á un calor suave, entre papeles, en la estufa; y consérvase en frascos, resguardados de la accion de la luz.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante y escarótica.*

Empléase en pomadas oftálmicas.

ÓXIDO MERCÚRICO ROJO.

Oxydum mercuricum rubrum.

BI-ÓXIDO DE MERCURIO.—ÓXIDO ROJO DE MERCURIO.—PRECIPITADO ROJO.—
Bi-oxydum vel oxydum rubrum hydrargyri.—Præcipitatus ruber.

Mercurio puro.	} De cada cosa partes iguales.
Ácido nítrico de 35°.	

Pónganse en una cápsula de porcelana; facilítase la disolucion del mercurio por medio de un suave calor, y evapórese luego el líquido hasta sequedad. Pulverícese el producto en mortero de vidrio ó de porcelana; vuélvase á colocar en la cápsula ó en una cazuela de barro no vidriada; calcínese, sin dejar de agitar la masa, hasta que cese completamente el desprendimiento de vapores nitrosos; pulverícese finamente el producto, y guárdese en frascos de vidrio negro. Debe operarse al aire libre, ó debajo de una chimenea que aspire bien los gases.

Colocado en una capsulita de porcelana, ó bien en un tubo de ensayo, y

calentándole á una temperatura próxima al calor rojo, se volatilizan sus elementos sin residuo, si el óxido es puro.

En ácido nítrico se disuelve sin residuo, y lo mismo en el clorohídrico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante y escarótica.*

Entra en la composicion de pomadas oftálmicas.

OXIDO ZÍNCICO.

Oxydum zincicum.

Sulfato zíncico cristalizado. 10 gramos.

Carbonato sódico cristalizado. 11 —

Disuélvase el sulfato en tres veces su peso de agua destilada, y el carbonato en cuatro; filtrense por separado ambas soluciones; hágase hervir la del sulfato, y precipítese por la del carbonato; recójase sobre un lienzo el precipitado de hidrocarbonato de zinc; lávese con agua destilada, hasta que las aguas de locion no se enturbien por el nitrato bórico, y séquese al aire libre ó por medio del calor. Calcínese en seguida en un crisol, á un fuego moderado; y cuando ensayada por un ácido una corta porcion, no desprenda ácido carbónico, apártese del fuego; guardándose en frascos de vidrio, despues de frio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos).

USO EXTERNO.—*Astringente.*

OXIMIEL DE COBRE.

Oxymel cupri.

UNGÜENTO EGIPCIACO.—Unguentum ægyptiacum.

Miel.	400 gramos.
Vinagre.	200 —
Cardenillo pulverizado.	140 —

Mézclense las tres sustancias, y hágase hervir la mezcla á fuego suave, agitándola sin cesar hasta que adquiera color rojo y consistencia de unguento.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Detergente.*



OXIMIEL DE COLQUICO.

Oxymel colchici.

Miel blanca.	690
Vinagre de cólquico.	240

Disuélvase la miel en el vinagre al calor del baño de maría, y fíltrese la solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética.*

DÓSIS.—De 2 á 8 gramos ($\frac{1}{2}$ á 2 dracmas), en pocion.



OXIMIEL ESCILÍTICO.

Oxymel scilliticum.

Prepárese con el vinagre de escila, como el oximiel de cólico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Diurética y expectorante.*

DÓISIS.—De 2 á 8 gramos ($\frac{1}{2}$ á 2 dracmas), en pocion.



OXIMIEL SIMPLE.

Oxymel simp' ex.

MIEL DE VINAGRE.—Mel aceti.

Prepárese con el vinagre blanco, como el oximiel de cólico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Atemperante y astringente.*

DÓISIS.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas), en pocion.

Se usa tambien en colutorio y gargarismo.



OXI-SULFURO ANTIMÓNICO SEMIVITRIFICADO.

Oxy-sulphurum antimonicum semivitrificatum.

HÍGADO DE ANTIMONIO.—Hepar antimonii.

Antimonio crudo.	12
Nitrato potásico.	12
Cloruro sódico.	1

Pulverícense estas sustancias; mézclense, y hágase deflagrar la mezcla, echándola en porciones en un crisol de barro enrojido; aumentese en seguida la temperatura hasta fundir la masa; déjese enfriar el crisol, y rómpase para recoger el producto, separado de la escoria.

Sirve para la preparacion de varios compuestos.

OXI-SULFURO ANTIMÓNICO SEMIVITRIFICADO LAVADO.

Oxy-sulphurum antimonicum semivitrificatum lotum.

AZAFRÁN DE METALES.—Crocus metallorum.

Tómese oxi-sulfuro antimónico semivitrificado; pulverícese finamente; lávese el polvo repetidas veces con agua hirviendo, hasta que ésta resulte insípida; y séquese al aire.

Sirve para otros preparados.

PAPEL EPISPÁSTICO.

Charta epispástica.

Núm. 1.º

Grasa de cerdo.	460
Cantáridas en polvo fino.	85
Cera blanca.	260
Esperma de ballena.	115
Tartrato antimónico potásico.	30

Núm. 2.º

Grasa de cerdo.	460
Cantáridas en polvo fino.	100
Cera blanca.	260
Esperma de ballena.	115
Tartrato antimónico potásico.	45

Núm. 3.º

Grasa de cerdo.	460
Cantáridas en polvo fino.	115
Cera blanca.	260
Esperma de ballena.	115
Tartrato antimónico potásico.	60

Póngase la grasa de cerdo con las cantáridas al calor del baño de maría, por espacio de seis horas; fíltrese despues por papel, colocado en un embudo de dobles paredes, que contenga agua caliente; añádanse la cera y el esperma; expóngase la mezcla á un calor suave, hasta que estas sustancias se lícuen; póngase despues el tartrato antimónico potásico, reducido á polvo fino; y déjese enfriar la masa, agitándola sin cesar. Lícuese de nuevo en una vasija de mucha superficie y poca altura; tómense tiras de papel sin cola, de 6 centímetros de ancho; pásense horizontalmente sobre la masa licuada, de modo que se impregnen bien por la superficie inferior; y déjense enfriar. Córtense, por fin, en porciones de 9 centímetros de largo; y colóquense en cajas numeradas de antemano, poniendo veinticinco papeles en cada una.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Irritante.*

Usado para mantener la accion revulsiva de los vejigatorios.

PAPEL SINÁPICO.

Charta sinapica.

Cahuchú en lámina.	4
Sulfuro de carbono.	100
Polvo de mostaza, privado del aceite fijo por presion.	C. S.

Divídase el cahuchú en pedacitos pequeños con unas tijeras; colóquese en un frasco de boca ancha con el sulfuro de carbono, y déjese bien tapado hasta que se disuelva. Extiéndase esta solución con una brocha de pelo fino sobre papel blanco y fuerte, y hágase caer, por medio de un tamiz, el polvo de mostaza, de modo que resulte una capa igual. Pásese por encima un cilindro de madera, á fin de que se adhiera bien la mostaza y quede la superficie lisa. Déjese expuesto el papel al aire para que se seque, y córtese con unas tijeras en pedazos de tamaño apropiado.

Este papel se usa, humedeciéndole con agua templada, y aplicándole al sitio designado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Revulsiva.*

PASTA DE AZUFAIFAS.

Pasta jujubarum.

Azufaifas secas.	230
Goma arábica blanca.	1380
Azúcar blanco.	1150
Agua de azahar.	90

Hiérvanse las azufaifas por media hora en 1035 gramos de agua; pásese el cocimiento por estameña, con expresion; déjese clarificar por reposo, y decántese. Por separado, disuélvase la goma en frio en 1730 de agua, y cuélese la solucion. Hágase un jarabe con el azúcar y el cocimiento de azufaifas, por ebullicion y clarificacion con albúmina; añádase la solucion de goma, y evapórese en baño de maría, hasta que tenga consistencia de extracto blando; mézclese el agua de azahar; póngase la vasija en baño de agua hirviendo; déjese en él por dos horas; sepárese la espuma de la pasta; viértase ésta en moldes de hoja de lata, frotados interiormente con aceite de almendras, y séquese en la estufa dentro de los mismos moldes.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE GOMA ARÁBIGA.

Pasta gummi arabici.

Goma arábica blanca en grano.	}	De cada cosa... 345 gramos.
Azúcar puro..		
Agua de azahar.		45 —
Claras de huevo.	Cinco.	
Agua comun.		345 —

Póngase la goma en maceracion con el agua comun; agítese de cuando en cuando la mezcla para facilitar la solucion, y pásese por una estameña mojada con agua caliente; échese en seguida el líquido en una vasija ancha; añádase el azúcar; y efectuada su solucion, evapórese al calor del baño de maría hasta consistencia de miel espesa. Bátanse por separado en otra vasija las claras

de huevo con el agua de flor de azahar, hasta que queden convertidas en espuma; añádase poco á poco esta espuma á la pasta; agítese fuertemente, y sosténgase la evaporacion, siempre en baño de maría, hasta que una porcion de la masa, extraida con la espátula y golpeada con el dorso de la mano, no se adhiera á ella; viértase entónces sobre pliegos de papel blanco; déjese al aire por dos dias; sepárese el papel, humedeciéndole con una esponja mojada; déjese secar la nueva superficie de la pasta, y córtese en pedazos de la figura y tamaño que se deseen.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE LÍQUEN.

Pasta lichenis.

Líquen.	345	gramos.
Goma arábica.	1725	—
Azúcar puro.	1380	—
Agua de azahar.	90	—

Prívase al líquen de su principio amargo por medio de tres lociones con agua á 60°; hágase despues, con el líquen lavado y cantidad suficiente de agua, decoccion por una hora; cuélese; disuélvase la goma en esta decoccion; pásese el líquido por estameña, con expresion suave del residuo; añádase el azúcar, y evapórese al baño de maría, agitando continuamente hasta la consistencia de miel espesa; añádase entónces el agua de flor de azahar, y sosténgase la evaporacion hasta que la masa adquiera consistencia fuerte, y no se adhiera al dorso de la mano. Viértase en seguida sobre una tabla de mármol ó sobre moldes

de hoja de lata, cubiertos con una capa ligera de polvo de azúcar; déjese enfriar, y córtese en pedazos de la forma y tamaño que se deseen.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE LÍQUEN OPIADA.

Pasta lichenis opiata.

Líquen.	345	gramos.
Goma arábiga.	1725	—
Azúcar puro.	1380	—
Agua de azahar.	90	—
Extracto de ópio.	3	—

Procédase como en la preparacion de la pasta de líquen, con la única modificacion de disolver el extracto de ópio en el agua de flor de azahar, ántes de añadirla á la masa.

Cada 30 gramos contienen 26 miligramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE MALVABISCO.

Pasta althææ.

Goma arábiga blanca en grano.	} De cada cosa...	345	gramos.
Azúcar puro.			
Raíz de altea seca y cortada.		30	—
Agua de azahar.		45	—
Claros de huevo.		Cinco.	

Póngase el malvabisco en maceracion con 240 gramos de agua, y despues de doce horas, pásese el líquido por estameña. Disuélvase por separado la goma en frio, en 345 gramos de agua, y cuélese esta solucion, tambien por estameña. Reúnanse los dos líquidos; pónganse con el azúcar, al calor del baño de maría, en vasija ancha; y procédase en lo demás como para la preparacion de la pasta de goma arábica.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE REGALÍZ.

Pasta glycyrrhizæ.

Extracto de regalíz.	60 gramos.
Goma arábica.	920 —
Azúcar puro.	575 —
Agua comun.	1550 —

Disuélvase en el agua el extracto de regalíz y la goma, al calor del baño de maría; pásese la solucion por estameña; añádase el azúcar; y evapórese, siempre en baño de maría, agitando continuamente hasta que la masa adquiera consistencia de pasta fuerte. Viértase sobre una tabla de mármol, ó sobre moldes de hoja de lata; déjese por algunos dias en la estufa, y córtese en pedazos de la forma y tamaño que se deseen.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

Uso.—*En pastillas.*

PASTA DE REGALÍZ OPIADA.

Pasta glycyrrhizæ opiata.

Extracto de regalíz.	60 gramos.
Goma arábica.	920 —
Azúcar.	575 —
Agua comun.	1550 —
Extracto de ópio.	0,7 —

Procédase como en la preparacion de la pasta de regalíz, con la única modificacion de añadir el extracto de ópio al mismo tiempo que el azúcar.

Cada 30 gramos de esta pasta contiene próximamente 12 miligramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.— *Calmante y demulcente.*

Uso.— *En pastillas.*

PEPSINA MEDICINAL.

Pepsina medicinalis.

Tómense cuajares de carnero ó de vaca, ó estómagos de puerco; límpiense y lávense con gran cantidad de agua; sepárese la membrana mucosa interna, raspando con un cuchillo sin filo y con punta redonda; póngase la pulpa resultante, bien dividida, en maceracion durante cuatro horas, con cuatro volúmenes de agua destilada, á la cual se añaden cuatro centésimas de alcohol, agitando de cuando en cuando; fíltrese rápidamente el líquido, sirviéndose de varios filtros; evapórese tambien rápidamente hasta

sequedad, á medida que va filtrando, en platos de ancha superficie, á una temperatura que no pase de 45°; sepárese con un cuchillo ó espátula el producto de la evaporacion; mézclase con la cantidad suficiente de azúcar de leche, para asegurar su conservacion; y guárdese en frascos bien tapados.

Un gramo de pepsina medicinal debe disolver 10 gramos de fibrina seca, haciendo el ensayo siguiente:

Agua destilada.	50	gramos.
Ácido clorohídrico de 22°.	0,5	—
Pepsina medicinal.	1	—
Fibrina seca	10	—

Colóquense todas estas sustancias en un frasco de boca ancha, y expóngase la mezcla en una estufa á la temperatura de 50°, durante seis horas, agitando de cuando en cuando. Al cabo de este tiempo, se ha de disolver completamente la fibrina.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se recomienda en ciertas dispepsias, con especialidad en las de carácter atónico.*

DÓSIS.—De 30 centigramos á 1 gramo (6 á 20 granos).

PERMANGANATO POTÁSICO.

Permanganas potassicus.

Sobreóxido de manganeso.	40
Clorato potásico.	35
Potasa cáustica.	50
Agua destilada.	C. S.

Redúzcanse á polvo fino el sobreóxido de manganeso y el clorato potásico, y mézclense; disuélvase la potasa cáustica en la can-

tiudad suficiente de agua, y añádase esta solución á la mezcla anterior. Introdúzcase la masa resultante en un crisol de hierro, y caliéntese, agitando sin intermision, á la temperatura del rojo incipiente, durante una hora; déjese enfriar el crisol; sáquese el producto; redúzcasele á polvo; introdúzcase éste en un matraz de vidrio; añádanse dos mil partes de agua hirviendo; agítese; déjese sedimentar; decántese el líquido rojo purpúreo que sobrenada; fíltresele por amianto ó vidrio pulverizado; neutralícese por el ácido nítrico muy diluido, y evapórese á un calor suave. Recójanse los cristales que se forman; colóquense sobre un embudo de cristal, hasta que escurra el líquido interpuesto; pónganse sobre un ladrillo absorbente, y repónganse, despues de secos, en frascos de tapon esmerilado.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se ha recomendado como tónico y reconstituyente.*

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granos).

USO EXTERNO.—*Como desinfectante, en solución.*

PÍLDORAS BALSÁMICAS.

Pilulæ balsamicæ.

Polvo de regalíz.	22 gramos.
Goma amoniaco pulverizada.	11 —
Ácido benzóico.. . . .	5 —
Polvo de azafran.	} De cada cosa... 1 —
Bálsamo peruviano líquido.	
Aceite de trementina sulfurado.	C. S.

Hágase masa pilular.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante del sistema mucoso, y expectorante.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

PÍLDORAS BENEDICTAS DE FULLER.

Pilulæ benedictæ ex Fuller.

Acíbar.	15	gramos.
Polvo de sen.	8	—
— de asafétida.	} De cada cosa...	4 —
— de mirra.		
— de gálbano.		
Sulfato ferroso.	22	—
Azafran en polvo.	} De cada cosa...	2 —
Mácias en polvo.		
Aceite pirogenado de succino.	2	—
Jarabe de artemisa.	C. S.	

Hágase masa pilular.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica, emenagoga y laxante.*

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos),

PÍLDORAS DE ACIBAR.

Pilulæ aloes.

Acíbar en polvo.	4	gramos.
Miel.	C. S.	

Mézclense bien y háganse cuarenta píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal y laxante.*

DÓISIS.—*Como estomacal*, de 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos);
como laxante, de 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

PÍLDORAS DE ACIBAR Y QUINA.

Pilulæ aloes et quinaæ.

Acíbar en polvo.	} De cada cosa....	2 gramos.
Extracto de quina de Loja.		
Canela del Ceylan en polvo.		0,5 —
Jarabe simple.		C. S.

Mézclese, y háganse segun arte cuarenta píldoras iguales.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal.*

DÓISIS.—*De 1 á 4 píldoras.*

PÍLDORAS DE ÁCIDO ARSENIOSO.

Pilulæ acidi arseniosi.

Ácido arsenioso en polvo fino.	0,1 gramos.
Goma arábica pulverizada.. . . .	1 —
Azúcar en polvo.	2 —
Agua destilada.. . . .	C. S.

Mézclense íntimamente la goma arábica, el azúcar y el ácido

arsenioso; añádase el agua necesaria para obtener una masa de consistencia pilular, y háganse cien píldoras iguales.

Cada una contiene un miligramo de ácido arsenioso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante, febrífuga, y de uso especial en algunas dermatosis.*

DÓSIS.—*De 1 á 2 píldoras.*

PÍLDORAS DE BLAUD.

Pilulæ ex Bland.

Sulfato ferroso.	} De cada cosa... 8 gramos.
Carbonato potásico sicc.	
Goma arábica.. . . .	4 —

Tritúrense con prontitud las dos sales, en mortero de hierro ó de piedra, hasta que la mezcla adquiera consistencia de pasta blanda; añádase la goma, y háganse cuarenta y ocho píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-reconstituyente.*

DÓSIS—*De 1 á 4 píldoras.*

PÍLDORAS DE CINOGLOSA.

Pilulæ cynoglossi.

Corteza de raíz de cinoglosa en polvo.	60 gramos.
Extracto de ópio pulverizado.. . . .	12 —
Polvo de azafran.	18 —
— de castóreo.. . . .	22 —
Azúcar en polvo.	7 —
Goma arábica en polvo.	14 —

Mézclense exactamente, y consérvase el polvo compuesto resultante en frascos bien tapados. Cuando hayan de prepararse píldoras, hágase la masa con este polvo y suficiente cantidad de agua.

Cada gramo contiene 9 centigramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Calmante y antiespasmódica. Empleadas especialmente para calmar la tos.*

DÓISIS.—De 2 á 5 decigramos (4 á 10 granos).

PÍLDORAS DE CLORURO MERCÚRICO.

Pilulæ chloruri mercurici.

PÍLDORAS DE DUPUYTREN.—*Pilulæ ex Dupuytren.*

Cloruro mercúrico en polvo fino..	0,1 gramos.
Extracto de ópio.	0,2 —
Extracto de guayaco.	0,4 —

Mézclense los extractos; añádase el cloruro, interponiéndole exactamente; y háganse veinte píldoras iguales.

Cada una contiene 5 miligramos de cloruro mercúrico y un centigramo de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antisifilítica.*

DÓISIS.—*Una píldora.*

PILDORAS DE COLOQUÍNTIDA COMPUESTAS.

*Pilulæ colocynthidis compositæ.*PÍLDORAS DE LARTIGUE.—*Pilulæ ex Lartigue.*

Extracto de coloquintida compuesto.	} De cada cosa. 1 gramos.
— de cólquico.	
— de ópio.	

Háganse según arte píldoras de 15 centigramos cada una.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante y diurética. De uso especial contra la gota.*

DÓSIS.—*Una píldora, repetida según convenga.*

PÍLDORAS DE COPAIBA.

Pilulæ copaybæ.

Copaiba.	60 gramos.
Óxido magnésico.	5 —
Polvos de raíz de altea.	60 —

Mézclense el bálsamo de copaiba y la magnesia, por trituración, en un mortero; déjese la mezcla por algunos días hasta que adquiera consistencia de trementina espesa; añádase entonces el polvo de altea, y hágase masa pilular.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante de las mucosas.*

DÓSIS.—De 5 decigramos á 1 gramo (10 á 20 granos), pudiéndose aumentar en las blenorreas hasta 4, y aún 8 gramos (1 ó 2 dracmas).

PÍLDORAS DE ESTORAQUE OPIADAS.

Pilulæ styracis opiatæ.

Estoraque líquido.	5 gramos.
Extracto de ópio.	0,5 —
Polvo de regalíz.	C. S.

Mézclense el estoraque y el ópio; añádase la cantidad necesaria del polvo de regalíz; y háganse cincuenta píldoras.

Cada píldora contiene 0,01 gramo de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante de las membranas mucosas, y con especialidad de la del aparato respiratorio. Usadas en las bronquitis crónicas con aumento de secrecion.*

DÓISIS.—*De 1 á 3 píldoras.*



PÍLDORAS DE EXTRACTO DE HELECHO MACHO.

Pilulæ filicis.

Extracto etéreo de helecho macho.	4 gramos.
Goma arábica en polvo.	} De cada cosa... 1 —
Agua.	
Polvo de helecho macho.. . . .	C. S.

Háganse cuarenta píldoras iguales.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antihelmintica. Empleadas especialmente contra la ténia.*

DÓISIS.—*Cinco píldoras, cuatro veces al dia, con intervalo de un cuarto de hora.*



PÍLDORAS DE FRANCK.

Pilulæ ex Franck.

GRANOS SALUTÍFEROS DE FRANCK.—Grana salutifera ex Franck.

Acíbar.	} De cada cosa... 15 gramos.
Jalapa.	
Ruibarbo.	4 —
Jarabe de ajenjo.	C. S.

Háganse píldoras de un decígramo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—*Purgante.*DÓISIS.—*De 1 á 4.*

PÍLDORAS DE IODURO FERROSO.

Pilulæ ioduri ferrosi.

PÍLDORAS DE BLANCARD.—Pilulæ ex Blancard.

Iodo.	4 gramos.
Limaduras de hierro puro.	2 —
Agua destilada.. . . .	6 —
Miel blanca.	5 —
Polvo de regaliz.	} Partes iguales... C. S.
— de malvabisco.	

Colóquense en un matraz de vidrio el agua y el hierro; añádase el iodo en porciones y agitando; déjese en contacto el tiempo suficiente, hasta que adquiera el líquido color verde, agi-

tándole á menudo; fíltrese, recogiendo el líquido en una cápsula, cuyo peso sea conocido, y en la cual se haya puesto la miel; lávese el matraz y el filtro con poca agua destilada, recogiendo también este líquido; evapórese la mezcla hasta que quede reducida á 10 gramos; y despues de fria, añádase la cantidad necesaria del polvo de regalíz y malvabisco, para que la masa tenga consistencia pilular; háganse cien píldoras, que se cubrirán primero con hierro porfirizado, y despues con un barniz preparado con resina, almáliga y bálsamo de tolú, disueltos en éter.

Consérvense en frascos bien tapados.

Cada píldora contiene 5 centigramos de ioduro ferroso.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Reconstituyente. De uso especial en la diátesis escrofulosa.*

DÓISIS.—*De 1 á 2 píldoras.*



PÍLDORAS DE IODURO MERCURIOSO.

Pilulæ ioduri mercuriosi.

Ioduro mercurioso.	1 gramos.
Extracto de ópio.	0,25 —
Conserva de rosas.	5,00 —
Polvo de regalíz.	C. S.

Mézclense el extracto y la conserva; añádase el ioduro y la cantidad necesaria de polvo de regalíz; y háganse cincuenta píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antisifilítica.*

DÓISIS.—*De 1 á 2 píldoras.*



PÍLDORAS DE MEGLIN.

Pilulæ ex Meglin.

Extracto de beleño.. . . .	} De cada cosa.. 30 gramos.
— de valeriana.. . . .	
Óxido zíncico.	

Háganse píldoras de 15 centigramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica calmante. De uso especial en las neuralgias faciales.*

DÓSIS.—*De 1 á 2.*



PÍLDORAS DE MORISON.

Pilulæ ex Morison.

Acíbar.	} De cada cosa... 1 gramos.
Resina de jalapa.. . . .	
Extracto alcohólico de coloquintida.	
Guta gamba.	
Ruibarbo.	} De cada cosa... 2 —
Mirra.. . . .	

Háganse cincuenta píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*

DÓSIS.—*De 1 á 2.*



PÍLDORAS DE RESINA DE JALAPA.

Pilulæ resinæ jalapæ.

Resina de jalapa.	2 gramos.
Jabon medicinal.	2 —
Alcohol de 90°.	4 —

Pulverícese en un mortero la resina; mézclese con el jabon medicinal; disuélvanse ambas sustancias en el alcohol, calentando en baño de maría; evapórese la solución hasta reducir la masa á 5 gramos; y háganse cincuenta píldoras iguales.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante drástica.*

DÓISIS.—*De 2 á 6 píldoras.*

PÍLDORAS DE SULFATO DE QUININA.

Pilulæ sulphatis quininae.

PÍLDORAS ANTITÍPICAS Ó ANTIPERIÓDICAS.—*Pilulæ antitipicæ seu antiperiodicæ.*

Sulfato de quinina.	1 gramo.
Miga de pan.	} Cantidad suficiente.
Goma pulverizada.	
Agua.	

Tritúrese bien el sulfato de quinina; mézclese con la cantidad necesaria de miga de pan y goma; añádase el agua suficiente para dar consistencia pilular á la masa, y háganse diez píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiperiódica y tónico-neurosténica, segun la dosis.*

DÓISIS.—*De 1 á 3 píldoras.*

PILDORAS DE TREMENTINA.

Pilulæ terebinthinæ.

Trementina comun. 5 gramos.

Hidrocarbonato de magnesia. 7 —

Háganse segun arte cincuenta píldoras iguales.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante de las membranas mucosas. Se emplean en las flegmasías crónicas de las mismas con aumento de secrecion.*

DÓISIS.—*De 3 á 6 píldoras.*

PILDORAS ESCILÍTICAS.

Pilulæ scilliticæ.

Jabon de sosa. 8 gramos.

Goma amoniaco en polvo. 4 —

Polvo de escila. } De cada cosa... 1 —

Copaiba. }

Hágase masa pilular.

Cada gramo de esta masa contiene 71 miligramos de escila.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Expectorante, resolutive y diurética.*

DÓSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos).

PILDORAS FERRUGINOSAS DE VALLET.

Pilulæ ferruginosæ ex Vallet.

Sulfato ferroso cristalizado.. . . .	75 gramos.
Carbonato sódico cristalizado.. . . .	90 —
Miel blanca.	45 —
Agua que contenga $\frac{1}{13}$ de su peso de azúcar C. S.	

Disuélvanse separadamente el sulfato ferroso y el carbonato sódico, en el cuádruplo de su peso del agua azucarada hirviendo; mézclense las dos disoluciones calientes, en una vasija que pueda taparse bien; acábase de llenar ésta con agua hirviendo, y tápese de modo que el aire no tenga acceso. Cuando el carbonato ferroso se haya precipitado bien, decántese el líquido claro; reemplácese prontamente con nueva cantidad de agua azucarada hirviendo; y cuando el precipitado se haya reunido de nuevo en el fondo, decántese otra vez el líquido claro. Trasládese entónces el carbonato ferroso precipitado á un lienzo tupido é impregnado de jarabe simple, y exprímase fuertementé; mézclese la miel, y evapórese la mezcla en baño de maría hasta consistencia pilular. Consérvese el producto en frascos bien tapados, para hacer extemporáneamente píldoras de 15 centigramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Tónica-reconstituyente. De uso especial en la clorosis.*

DÓSIS.—De 2 á 4 píldoras.

PÍLDORAS FUNDENTES.

Pilulæ fundentes.

PÍLDORAS ALOÉTICAS REO-JABONOSAS.—Pilulæ aloeticæ reo-saponacæ.

Acíbar en polvo.	} De cada cosa... 1 gramo.
Ruibarbo en polvo.	
Jabon medicinal.	

Mézclense y háganse treinta píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal y fundente.*

DÓSIS.—De 1 á 3 píldoras.



PIROFOSFATO SÓDICO.

Pyrophosphas sodicus.

Calcínese el fosfato sódico cristalizado, á la temperatura del rojo, en un crisol, hasta que una pequeña porcion de la masa, disuelta en agua y tratada por el nitrato de plata, dé un precipitado perfectamente blanco; disuélvase la materia calcinada, despues de fria, en agua destilada hirviendo; fíltrese la solucion, y hágase cristalizar.

Cristales incoloros, no eflorescentes. La solucion acuosa es néutra, y forma precipitado blanco con el nitrato de plata.

Sirve para otros preparados.



PIROXILINA.

Pyroxylina.

ALGODON-PÓLVORA.—*Gossypium igniarium*.

Nitrato potásico en polvo.	20
Ácido sulfúrico de 66.º.	30
Algodon en rama.	1

Póngase el nitrato potásico en una campana de pie, añádase el ácido sulfúrico, y agítese la mezcla hasta que el nitrato se haya descompuesto; introdúzcase el algodón por pequeñas porciones en el líquido, cuando su temperatura sea de unos 30º; mézclese bien; tápese la campana, y déjese todo por veinticuatro horas á una temperatura de 20º á 30º. Sáquese despues el algodón; lávese sin exprimirle, primero con agua fria, hasta quitar todo el ácido, y despues con agua hirviendo, hasta extraer todo el sulfato potásico; y séquese, por último, al aire. Consérvese en frascos bien tapados.

Sirve para preparar el colodion.

PLATA PURA.

Argentum purum.

Plata del comercio.	1
Ácido nítrico de 35º.	2

Disuélvase la plata en el ácido á un calor suave; dilúyase la solución en doce veces su peso de agua; añádase poco á poco ácido clorohídrico ó cloruro sódico, hasta que cese la formación de precipitado; recójase éste sobre un filtro, y despues de bien lava-

do y seco, mézclase con un peso igual de carbonato sódico desecado. Póngase la mezcla en un crisol de barro; caliéntese fuertemente hasta que la masa esté en fusión tranquila; rómpase el crisol despues de frio, y recójase el boton de plata pura, que se hallará en el fondo.

Sirve para otros preparados.

POCION AMONIALCAL.

Potio ammoniacalis.

Amoniac liquido..	1 gramos.
Jarabe simple.	20 —
Agua.	100 —

Mézclase el amoniaco con el agua, y añádase el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estimulante y diaforética. Recomendada contra la embriaguez.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

POCION ANTIESPASMÓDICA.

Potio antispasmodica.

MISTURA ANTIESPASMÓDICA.—Mistura antispasmodica.

Agua de azahar.	De cada cosa... 60
— de melisa.. . . .	
Jarabe de corteza de cidra..	30
Éter sulfúrico alcoholizado..	1,5

Mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante-antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

POCION ANTIESPASMÓDICA CON LÁUDANO.

Potio antispasmodica cum laudano.

MISTURA ANTIESPASMÓDICA LAUDANIZADA.—*Mistura antispasmodica laudanisata.*

Agua de azahar.	} De cada cosa... 60
— de melisa.	
Jarabe simple.	30
Láudano de Sydenham.	2
Éter sulfúrico alcoholizado.	1

Mézcense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica-calmante.*

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

POCION DE CITRATO MAGNÉSICO.

Potio citratis magnesici.

LIMONADA DE CITRATO DE MAGNESIA.—*Potio citratis magnesicæ.*

Ácido cítrico en polvo.	24 gramos.
Sub-carbonato magnésico.	16 —
Agua.	300 —
Jarabe de corteza de cidra.	30 —

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el sub-carbonato; y terminada la reacción, fíltrese el líquido y añádase el jarabe.

Contiene 30 gramos de citrato magnésico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—*La fórmula en dos veces.*

POCION DE CITRATO MAGNÉSICO GASEOSA.

Potio aërophora citratis magnesici.

LIMONADA GASEOSA DE CITRATO DE MAGNESIA.—*Potio aërophora citratis magnesicæ.*

Ácido cítrico en polvo.	24 gramos.
Sub-carbonato magnésico.	12 —
Agua.	300 —
Jarabe de corteza de cidra.	30 —
Bicarbonato sódico.	2 —

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el sub-carbonato magnésico; y terminada la reacción, fíltrese el líquido y añádase el jarabe. Póngase esta solución en una botella fuerte; introdúzcase el bicarbonato sódico, reducido previamente á un pequeño bolo por medio de un poco de mucílago de goma; y tápese prontamente, asegurando el corcho con un bramante ó con un alambre.

Contiene 30 gramos de citrato magnésico.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—*La fórmula en dos veces.*

POCION ESTIBIO-ÓPIADA.

Potio stibio-ópiata.

Tartrato antimónico potásico.	0,4 gramos.
Agua de azahar.	180 —
Jarabe de meconio.	} De cada cosa... 15 —
Jarabe simple.	

Disuélvase el tartrato en el agua de flor de naranjo, y añádanse los jarabes.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Resolutiva. De uso especial en ciertas pneumonías.*

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza).

POCION GASÍFERA.

Potio gasifera.

POCION Ó MISTURA ANTIEMÉTICA.—Potio vel mistura antiemetica.

Bicarbonato de sosa.	3 gramos.
Agua de canela.	3 —
Agua comun.	80 —
Jarabe de corteza de cidra.	15 —

Disuélvase el bicarbonato en el agua; añádanse el agua de canela y el jarabe, y colóquese en un frasco señalado con el número 1.

Ácido cítrico.	3 gramos.
Agua de canela.	3 —
Agua comun.	70 —
Jarabe de corteza de cidra.	15 —

Disuélvase el ácido en el agua; añádanse el agua de canela y el jarabe, y colóquese en un frasco señalado con el núm. 2.

Para administrar este medicamento, échese una cucharada del contenido de cada frasco en un vaso; agítese, y tómese en el momento de presentarse la efervescencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiemética.*

DÓSIS.—*La señalada en la fórmula.*

POCION GOMOSA.

Potio gummosa.

Goma arábica en polvo.	8 gramos.
Jarabe de altea.	30 —
Agua comun.	90 —
— de azahar.	15 —

Disuélvase la goma en el agua comun, en mortero de vidrio ó de porcelana, y añádanse el jarabe y el agua de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Demulcente.*

DÓSIS.—*A cucharadas.*

POCION IODURADA.

Potio iodurata.

Agua destilada.	150 gramos.
Ioduro potásico.	4 —
Jarabe simple.	20 —

Disuélvase el ioduro en el agua, y añádase el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Alterante y antisifilitica.*

DÓISIS.—De 15 á 60 gramos ($\frac{1}{2}$ á 2 onzas).

POCION SEDANTE.

Potio sedans.

Cloruro mórfico.	0,05	gramos.
Nitrato potásico.	4	, —
Agua destilada.	345	—
Jarabe de digital.	30	—

Disuélvanse las dos sales en el agua, y añádase el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Sedante. De uso conveniente en las afecciones febriles de tipo continuo.*

DÓISIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

PODOFILINA.

Podophyllina.

RESINA DE PODOFILO.—Resina podophylli.

Rizoma de podofilo.	20
Alcohol de 90°.	120
Agua destilada.	24

Pulverícese el podofilo, y trátase el polvo con el alcohol, en diferentes veces, hasta obtener todo lo soluble; reúnanse los líquidos alcohólicos, y destílense en baño de maría, para aprovechar el alcohol. Añádase sobre el residuo el agua destilada fria; agítese, y déjese despues en reposo durante veinticuatro horas; al cabo de

las cuales decántese el líquido, lávese el residuo con agua fría, y deséquese, por último, á un calor moderado (25° á 30°).

Polvo amarillento, soluble en alcohol y éter.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Purgante.*

DÓISIS.—De 3 á 10 centigramos ($\frac{1}{2}$ á 2 granos).

POLVO ARSENICAL DE FR. COSME.

Pulvis arsenicalis ex Fr. Cosme.

POLVO ESCARÓTICO DE FR. COSME.—**Pulvis scaroticus ex Fr. Cosme.**

Arsénico blanco.	4
Cinabrio.	20
Ceniza de suela.	8

Redúzcanse á polvo fino, y mézclense.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Escarótica.*

POLVO ASTRINGENTE.

Pulvis astringens.

POLVO DE LA MEZCLA.—**Pulvis mixtionis.**

Sulfato aluminico potásico anhidro	} De cada cosa 10 gramos.
en polvo.	
Polvo de quina de Loja.	
— de rosa rubra.	

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente y tónica.*

Se usa en heridas y úlceras fungosas y atónicas.

POLVO DE ACÍBAR.

Pulvis aloes.

Divídase el acíbar en pedazos, por medio de un cuchillo ó por contusion; séquese en la estufa; pulverícese por trituracion en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz fino, sin dejar más residuo que el formado por los cuerpos extraños.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Estomacal y purgante.*

DÓISIS.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos), como estomacal; y de 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), como purgante.

POLVO DE ÁCIDO SALICÍLICO.

Pulvis acidi salicylici.

Redúzcase el ácido salicílico á polvo fino en mortero de cristal ó de porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Se usa especialmente en el tratamiento del reumatismo.*

DÓISIS.—De 25 á 50 centigramos (5 á 10 granos).

USO EXTERNO.—*Como excitante y antiséptico.*

POLVO DE ALCANFOR.

Pulvis camphoræ.

Póngase el alcanfor en un mortero de porcelana; añádase alcohol rectificado, poco á poco y en cantidad suficiente; y tritúrese hasta que resulte un polvo igual y suave al tacto.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos).



POLVO DE ALMIZCLE.

Pulvis moschi.

Prepárese como el de castóreo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, difusiva y antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos).



POLVO DE ASAFÉTIDA.

Pulvis assafetidæ.

Prepárese en mortero de hierro ó de bronce por trituracion suave, eligiendo para la operacion un tiempo seco y frio; y pásese por un tamiz entrefino, desechando el residuo formado por las impurezas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓISIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).

Se usa tambien en enemas, diluido convenientemente.

POLVO DE AZAFRAN.

Pulvis croci.

Prepárese como el de santónico, dejando cuatro centésimas de residuo.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante, antiespasmódica y emenagoga.*

DÓISIS.—De 6 decigramos á 1 gramo ($\frac{1}{2}$ á 1 escrípulo).

POLVO DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

Pulvis balsami tolutani.

Prepárese como el de acíbar.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Excitante especial de las membranas mucosas.*

DÓISIS.—De 15 á 30 centigramos (3 á 6 granos).

POLVO DE BELLADONA.

Pulvis belladonnae.

Prepárese como el de digital.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Anodina, antiespasmódica y sedante de la inervacion motriz.*

DÓSIS.—De 2 á 5 centigramos ($\frac{1}{2}$ á 1 grano).

POLVO DE CANTÁRIDAS.

Pulvis cantharidum.

Expónganse las cantáridas al sol ó en estufa, por el tiempo puramente necesario para su desecacion; pulverícense acto continuo, por contusion, en mortero de hierro ó de bronce; y pásese el polvo por un tamiz entrefino, sin dejar residuo.

El operador debe cubrir con gran cuidado el mortero y el tamiz, para preservarse de este polvo.

Sirve para preparar emplastos vesicantes.

POLVO DE CASTÓREO.

Pulvis castorei.

Divídanse los castóreos en pedazos; séquense al aire; sepárese la membrana exterior y las interiores, cuya eliminacion sea posible; pulverícese el resto en mortero metálico, por trituracion; y pásese el polvo por un tamiz entrefino, desechando el residuo que esté constituido tan solo por partes membranosas.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Antiespasmódica.*

DÓSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos).
